

383

NAZ.

■

V

BIBLIOTECA NAZ.

Vittorio Emanuele III

LXIV

A

52

NAPOLI

27-

E.

14+



LXIV.A.52

MI

SIMP

SID

C

LXIV. A. 52

MEDICINÆ PRAXEOS

COMPENDIUM,

SIMPTOMATA , CAUSAS , DIAGNOSIN , PROGNO-
SIN , ET MEDENDI RATIONEM , EXHIBENS.


AUCTORE

E. G. CLARKE , M. D.

Collegii Regalis Medicorum Londinensis ,
nec non Exercitus , Medico.


EDITIO QUINTA

Plutonium aucta et emendata.



NEAPOLI MDCCCXVII.
TYPIS XAVERII JORDANI.

Prostat apud XAVERIUM D'ONOFRIO
in Via Nilo num. 6.





INDEX CAPITUM.

CLESSIS I. PIREXIÆ.

ORDO I.	Febres	<i>pag.</i> 1
	II. Phlegmasiae	17
	III. Exanthemata	67
	IV. Haemorragiae	89
	V. Profluvia	109

CLASSIS II. NEUROSES.

ORDO I.	Comata	115
	II. Adynamiae	120
	III. Spasmi	125
	IV. Vesaniae	151

CLASSIS III. CACHEXIAE.

ORDO I.	Marcores	157
	II. Intumescentiae	159
	III. Impetigines	172

CLASSIS IV. LOCALES.

ORDO. I.	Dysaesthesiae	185
	II. Apocenoses	188
	III. Epischeses	189
	IV. Dialyses	195

MEDICINÆ PRAXEOS

COMPENDIUM.

CLASSIS I. PYREXIÆ.

CHARACTER.

Post horrorem pulsus frequens, calor major, plures functiones laesae, viribus praesertim artuum imminutis.

ORDO I. FEBRES.

CHARACTER.

Praegressis languore, lassitudine, et aliis debilitatis signis: pyrexia sine morbo locali primario.

CAPUT I. INTERMITTENTES.

TERTIANA.

SYMPTOMATA.

STADIUM primum oscitatione, pandiculatione, lassitudine, debilitate, habitus externi extenuatione, dorsi, digitorum

apicum dolore vel molestiae sensu incipit, haec subsequuntur rigor, horror, frigorisque sensus in dorso primum tunc in corpus totum quando revera magis calet; nausea, vomitus, capitis, lumborum, artuumque dolor comitantur; respiratio difficulter fit et anxia, pulsus cito tatus, debilis ac parvus et urina limpida; frigore gradatim recedente excipit stadium alterum; calor urget intensus, pulsus fit plenus, validus atque durus, respiratio magis libera sed anxia; superficies rubra et turgida; lingua alba, siccata; sitis magna, capitis dolor immanis, nonnumquam etiam delirium, comitantur, et urina rubella demittitur; aegro fere exarescente stadium tertium incipit, sudor erumpit copiosus, urina sedimentum lateritium deponit; restituuntur omnes secretiones, sublevantur symptomata et sudore cessante omnino tolluntur, debilitatis solummodo sensu manente. Paroxysmi sunt similes intervallo quadraginta octo circiter horarum et accessionibus meridianis. Intermittentes in vernalcs et autunnales sunt interdistinctae.

C A U S E.

Debilitas ; effluvia ex paludibus vel agris humidis exhalata , atmosphaera humida ; frigus externe admotum , contagium et impulsus fortasse lunaris .

P R O G N O S I S .

Symptomata fausta sunt , paroxysmi regulares non supra horas duodecim perdurantes ; pustulae morbo decedente circa labia erumpentes ; urina sedimentum deponens : Infausta sunt , coma , delirium , anxietas magna , singultus , tonsillarum tumor , alvus pertinaciter astricta , hypochondrii et epigastrii paroxysmo durante tensio et dolor ; cibi aversatio vel debilitas vertigine in intermissionibus comitata ; macularum crebra eruptio urticationem referentium .

C U R A.

Primae viæ lenibus emeticis et catharticis sunt purgandæ, et in intermissione tonica præcipue cinchona, amara; astringentia largis dosibus sunt administranda; si haec nihil valeant oxidum arsenici; sulphas zinci; hydrargyri præparationes: finis paroxismo imponatur si datum sit emeticum in gradu frigido, vel opii dosis plena in gradu calido: si adsit diathesis phlogistica venae sectio est peragenda; si magna superveniat debilitas diaeta nutriendis est utenda: si coma vel delirium, epispatica, cardia-
ca. Ad recidivam præcavendum cinchona vel alia ejusmodi remedia breve sunt administranda; causis excitantibus studiose evitatis. An arteriarium femoris et brachii compressio? an aquae frigidæ affusio stadio secundo? an anthemis pyrethrum in dosi drachmae dimidiae frequenter.

QUARTANA ET QUOTIDIANA.

In iis paroxysmi sunt similes , sed in quartana intervallum septuaginta duarum circiter horarum exicit accessionibus pomeridianis: in quotidiana intervallum viginti quatuor circiter horarum subsequitur paroxysmis matutinis: Medendi ratio est eadem ac in tertiana , sed quartana sauitu longe difficultior est , quam vel quotidiana , vel tertiana .

CAP. II: SYNOCHA.

SYMPTOMATA.

Ab orrore perquam insigni incipit ; calore intenso , vultu rubro turgente , cephalalgia , lumborum dorsique dolore , oculorum rubidine , lucis impatientia , sequentibus : cutis , lingua , faucesque sunt aridae ; sitis magna , tussis sicca , anorexia , nausea , vomitus , anxietas , inquietudo et jactatio molesta urgent;

(6)

olfactus evadit imminutus , alvus plerumque astricta , urina rubra , pulsus frequens , validus et durus ; sensorii functiones parum sunt turbatae , et sanguis detractus crusta albida vel subflava est obductus .

C A U S E .

Evacuationes consuetae subito suppressae ; perfrigeratio calefacto corpore ; labor intensus corporis animique ; insolatio ; eruptiones subito repulsae ; animi pathemata violenta ; diaeta valde spirituosa , vel helluatio .

D I A G N O S I S .

Ab typho , pulsu valido , calore , doloribus intensis , siti magna et sensorii functionibus parum turbatis , dignoscitur .

P R O G N O S I S.

Morbus circa diem septimum , haemorrhagia , sudore , urina sedimentum deponente , rarius alvi fluxu , fauste frequenter solvitur : Respiratio valde labiosa ; dolor capitis immanis cum delirio feroci , urina pallida et diluta , abdominis viscerumque affectiones et cutis ante diem septimum flavedo , infausta sunt signa.

C U R A.

Venasectio generalis repetita secundum aegri aetatem , corporis habitum , consuetudinem vivendi , anni tempestatem et morbos tunc temporis frequentes , et si urgeat capitis dolor hirudines temporibus sunt admovendae ; tunc emeticum ; cathartica seu enemata laxantia indies si opus sit , tartris antimonii portiunculis ad nauscam tantum non ciendum ; sales medii ; diluentia tepida

acidis adjunctis ; corporis animique quies ; regimen antiphlogisticum : si delirium , thoracis vel abdominalis affectiones urgeant , sanguinis missione , laxantibus , vesicatoriis et pediluviis sunt admovendae : an muriabatyae ? an digitalis ? an hydragiri praeparationes ad lenem saliva fluxuciendum ?

CAP. III. TYPHUS MITIOR.

SYMPTOMATA.

Sub initio signa sunt , debilitas , languor , lassitudo inusitata , appetitus prostratus redditus frequentes frigoris levis et caloris alternorum abnormes , animi dejectio , cum suspiriis reiteratis ; elapsis diebus aliquot , aeger , capitis dolore vel vertigine , frigorisque sensu praesertim occipitis , nausea , pituitae insipidae vomitu : magna que virium prostratione , tentatur ; calor parum auctus est , siti nulla urget , lingua in initio humida est crustaque alba obducta , postea sicca ,

(g)

rubra et aliqua in parte fissa , vultus pallidus atque depresso , pulsus parvus, debilis plerumque frequens , respiratio laboriosa cum constrictio nis circa praecordia sensu , urina parum mutata et sensorii functiones plurimum turbate , comitantur.

C A U S E .

Affectus animi contristantes ; diaeta tenuis; vita sedentaria ; evacuationes nimiae ; venus immodica ; contagium ; atmosphera calida et humida ; sanguinis paucitas.

D I A G N O S I S .

Ab typho graviori , lento ejus impetu, rigoribus minus intensis , cutis pallore , sitis nulla et omnibus signis levioribus , distinguitur.

a. 5.

PROGNOSIS.

Symptomata bona snnt , lingua cutis-que humida ; pulsus tardior et magis validus post diaphoresin lenem vel cardiacorum administrationem ; pustulae circa labia naresque ; eruptio miliaris sine sudore profuso : surditas : salivatio libera sine aphthis. Mala sunt , delirium cito comparens et perdurans ; evacuationes profusae pulsu debili stipatae ; subsultus tendinum ; manuum linguae-que tremor ; venatus floccorum volitantium ; pervigilium ; oculorum stupor ; caecitas ; coma ; deglutitio impedita prae- cipue singultu comitante ; petechiae.

C U R A.

Emetica praecipue sub morbi initium nunquam sunt praetermissu ; primae viae laxantibus et clysmatibus emollientibus sunt deplendae ; diaeta nutriens foret ; cardiaca praecipue vinum et opium portiunculis tertia quaque hora re-

petita alternatim ; episistica parva repetita ; pediluvia vel crurum fatus praecipue si urgent jactatio et vigilia ; corporis aqua tepida et acido acetoso lavatio et postea ejus perexsiccatio ; gas oxygenium ; acida mineralia ; cerevisia lagenaria , cerevisia pini laricis etc. ; spuma cerevisiae effervescentis , remissione comparente , vel lingua cutique humidis , cinchona libere est adhibenda. Nuper in pyrexiae exacerbatione , quae , die advesperascente , vultus erubescencia , siti , et inquietudine auctis , notatur , aquae ; frigidae corpori nudato affusio summo cum fructu usurpata fuit praecipue si corpus sit praeter naturam calidum ; aqua frigida libere est haurienda : an capsici annui grana pauca secunda quaque hora vel saepius in forma pilulae ? an sub murias hydrargyri parvis et repetitis dosibus ad morbi cationem cohibendum ? an murias potassae oxygenatus.

CAP. IV. TYPHUS GRAVIOR.

SYMPTOMATA.

Rigores sub initium magis sunt vehementes quam in typho mitiori, quos excipiunt calor intensus et mordax; pulsus durus, parvus, debilis, plerumque frequens et abnormis; capitis temporenumque dolor; vibrant arteriae carotidæ temporalesque, maxima virium prostratio et debilitas, animus anxius, dejectus, pessima quaevis ominans, nausea, vomitus bilis subviridis vel nigri coloris comitantur; oculi inflammantur et circa orbite fundum dolent, vultus est inflatus et cadaverosus; dorsum, artus, cordisque scrobiculus dolent; cutis arida est cum ingrato calore pungenti; sitis inexplebilis cum oris sapore ingrato vexat: lingua primo alba, postea, arida, nigraque: dentes, labiaque, sorde tenaci oblinuntur; vertigo, aurium tinnitus, respiratio laboriosa suspiriis

interrupta urgent; urina primo pallida, postea rubra vel nigra, sedimentum fuligineum vel foetidum deponit; morbo ingravescente delirium vel potius stupor et umorum putredinis signa accedunt, qualia sunt petechiae, maculae, vibices, aphthae circa os et fauces nigri coloris cum deglutitione impedita, urina et alia excreta sanguine tinguntur; faeces sunt immodice foetidae; haemorrhagiae gingiyis et intestinis profluunt.

CAUSES.

Victus pravus et putridus; aer humidus calidusque; debilitas; effluvia animalium et vegetabilium; diaeta tenuis; evacuationes immodice; venus immode-
nata; contagium.

DIAGNOSIS.

Historia supra tradita, ad hanc febrem ab typho mitiori et synoeca distinguendum, sufficit.

PROGNOSIS.

Color faecum luteus vel fuscus ; diaphoresis lenis ; salivatio ; parotidum , axillarum vel inguinum glandularum suppuratio ; eruptiones circa labia naresque stupor ; surditas ; petechiarum color nitidus ; urina sedimentum deponens , fausta sunt symptomata . Sitis nulla ; petechiae magna copia vel eorum recessio subita cum pulsu valde debili ; aphthae lividae ; faucium inflammatio ; respiratio valde difficilis cum narum pinnarum motu magno ; magna debilitas ; dejectiones liquidae abdomine tenso ; decubitus in dorsum membris extensis ; sudores profusi ; urina foetida ; haemorrhagiae ; coma altum ; tendinum subsultus ; odor corporis cadaverosus ; infausta sunt symptomata .

C U R A .

Emeticum sub morbi initium est propinandum , et paucis horis elapsis sub-

muriatis hydrargyri grana tria vel quatuor conserva vel mucilagine commisti sunt administranda ; laxantia indies , ut rheum palmatum et similia seu enemata mitia , ad intestina deplendum materiae putridae vel putrescentis quae jam in corpore subest , sunt uti ; antiseptica et cardiaca , qualia vinum , opium , cinchona , ut in typho , libere sunt datu : gas acidum carbonicum in ventriculum acceptum et per anum injectum ; refrigerantia , qualia , acida mineralia ; sales medii : diaeta nutriens ; lavatio frigida vel aquae frigidae corpori nudato affusio ut in typho mitiori ; mundities summa prae omnibus est ; aer cubiculi foret purissimus ; et morbo decedente seu debilitate magna superveniente episistica parva repetita : Diarrhoea , laxantibus , acidis et opitiatis sublevanda ; Delirium , pediluviiis , crurum fotu et episasticis .

CAP. V. SYNOCHUS.

CHARACTER..

Morbus contagiosus , febris ex syno-
cha et thypho composita , initio synocha,
progressu et versus finem typhus.

CURA.

Hujus morbi medela secundum ejus
typum est dirigenda , sed venaesectio
summa cum cautela est peragenda.

CAP. VI. FEBRIS REMITTENS.

Haec iisdem cum symptomatibus ut
febris intermittens incipit , causae et me-
dendi ratione sunt similes .

CAP. VII. FEBRIS HECTICA.

CARACTER.

Febris quotidie revertens; accessionibus meridianis et vespertinis; remissione, rarius apyrexia matutina; plerumque cum sudoribus nocturnis et urinæ sedimentum surfuraceo lateritium depонente.

Symptoma solummodo est Phthiseos, et alio in loco tractabitur.

ORDO II. PHLEGMASIÆ.

CARACTER.

Febris synocha; phlogosis, vel dolor topicus, simul laesa partis internæ functione; sanguis missus et jam concretus, superficiem cōriaceam albam ostendens. Species sunt Phlogosis. (Phlegmone) et Erytema seu Erysipelas.

CAP. I. PHLEGMONE.

CHARACTER.

Synocha , rubore vivido , tumore circumscripto , in fastigium plerumque elevato , saepe in apostema abeunte ; dolore saepe pulsatili ; resolutione , suppuratione et gangraena terminato : quando resolutione terminatur , decedit inflammatio partis textura integra manente ; sin augescant symptomata , tumore ad apicem elevato cum pulsatione et rigoribus frequentibus , sequetur suppuratione , et pure formato , remittit dolor , tumor albescens : mollis , fluctuans et pruriens evadit : expectanda est gangraena ; rubedine , calore , tensioneque sublatis , et gangraena formata pars affecta nigrum lividumve colorem induit , cum sensibilitatis privatione , cuticula simul vesiculis obsita .

C A U S A E.

Materiae acris parti applicatio , vis ex-
terna ; corpora extranea in corpora sium
frigus et causae quae synocham indu-
cunt.

FROGNOSIS.

Periculum majus est si partes ad vi-
tam inservientes afficiantur , gangrenae
proclivitas ab signis supra memoratis in-
telligetur , in internis inflammationibus
plus periculi subest quam externis.

C U R A E.

Ad resolutionem promovendum regi-
men antiphlogisticum stricte est adhi-
bendum ; venaesectio secundum aegri
vires et symptomatum violentiam ; hiru-
dines parti affectae ; cathartica ; diluen-
tia ; refrigerantia ; discutientia externe ut
acetis plumbi , acidum acetosum , etc.
Suppuratio , cataplasmatibus emollienti-

bus et fomentis est promovenda ; Gangraena , tonicis et antisepticis est amo-
venda , quorum optima sunt vinum ; cinchona ; opium : ammoschus et carbo-
nas ammoniae largis dosibus ?

CAP. II. ERYTHEMA.

SYMPTOMATA..

Partis affectae splendor et rubor pres-
sione evanescens sed cito rediens ; tumo-
re vix evidente cum dolore urente ; mor-
dace ; abitu inaequali , ex uno in alium
locum vicinum serpente , in cuticulae
squamulas vel vesiculas raro in gangrae-
nam abeunte : Haec est sola cutis affe-
ctio ; quando afficitur sistema erysipelas
appellatur..

G A T U S A .

Materia acris cuti applicata vel ex in-
ternis emissa ; relaxautia.

C U R A.

Regimen antiphlogisticum; applicatio topica amyli vel carbonatis zinci impnri; cinchona: si adsit diathesis phlogistica, venaesectio, cathartica, diluentia et similia sunt usurpanda.

CAP. III. OPHTALMIA MEMBRANARUM.

SYMPTOMATA.

Tunicae adnatae, rubor, ardor, oculique dolor, muscae vel spinae in eo inhaerentis sensus; lachrymarum effusio; lucis intolerantia; nonnunquam pyrexia vehemens. Idiopathica vel symptomatica est.

CAUSES.

Externa violentia; aliena corpora in oculum insinuata, fumi metallici; pal-

pebrarum intus conversi pili ; ebrietas ; lucis intentior intuitus ; variola ; scrophula ; syphilis.

C U R A .

Si sit affectio idiopathica ? sanguinis missio generalis et topica ; adnatae vasorum scarificatio ; alvi purgatio ; vesicatoria pone aures , irritationis omnis praecipue lucis evitatio : applicationes topicae , quales , acetis plumbi , zinci præparations , etc. aqua solutae : opiate interne et tinctura thebaica prioris Pp. Lond. topice ; regimen antiphlogisticum. Si superveniret parti affectae erysipelas , tonica , qualia , cinchona , balneum frigidum , oculi aqua frigida lavatio et similia sunt utenda et astringentia supra memorata : quando sit signum luis venereae hydrargyri præparations sunt utendae : quando scrophulae sit symptoma , tonica , cicuta , aquae chalybeatae externe cataplasma sulphatis aluminae vel rumicis acetosae ; unguendum nitratis hydrargyri et similia sunt admovenda.

CAP. IV. OPHTALMIA Tarsi.

CHARACTER.

Signis supra memoratis addi possunt, tarsi palpebrarum tumor, erosio et exudatio glutinosa; adnatae inflammatio minus violenta.

CURA.

Medendi ratio eadem est ac in priori specie nisi quod ulcera praeparationes cupri, hydrargyri et zinci postulant; palpebrarum adhesioni durante somno obviam itur, illinendo eas unguento oxi-di zinci impuri vel spermatis ceti.

CAP. V. PHRENITIS.

SYMPTOMATA.

Pyrexia vehemens, dolor capitis intensus; rubor faciei et oculorum; au-

rium tinnitus; vultus ferox; soni lucis-que intollerantia; pervigilium; delirium ferocissimum; vix maxima; arteriarum carotidum et temporum pulsatio; respiratio laboriosa; lingua arida et fusa; pulsus plerumque celer et durus, nonnunquam mollis.

C A U S A.

Causae remote sunt omnes quae synocham producunt; animi pathemata violenta; insolatio; nimia potatio; vis externa capiti illata; tempestas servida; nocturna studia. Causa proxima est cerebri ipsius vel membranarum ejus affectio.

D I A G N O S I S.

Ab mania dignoscitur pyrexia violenta, et ab synocha delirio feroci sub initium accidente.

P R O -

PROGNOSIS.

Signa fausta sunt, sudores universi; diarrhaea copiosa; epistaxis; urina sedimentum deponens. Signa infesta sunt, vomitus aeruginosus; faeces albae vel cinereae; sputatio indecora in adstantes; pupilla ampla ad lucem immota; masticatio continua cum oris spuma; floccorum volitantium venatus; oculi pulvрulenti; potus pertinax recusatio; deglutitio laboriosa; tremor; convulsio; coma: subsultus tendinum: ab pneumonia lethalis.

CURA.

Venaesectio larga, vulnere adeo ampio ut plurimus sanguis per id brevi effluat, repetita; hirudines temporibus vel cucurbitulae cruentae postea sunt admovendae; alvi purgatio, epispastica capiti raso; pediluvia; regimen antiphlogisticum; diluentia: applicationes externae, ut lin-

b

tea in acido acetoso et aqua persrigida madefacta capiti admota et debilitate magna superveniente opii tincturae guttae paucae frequenter : corpus erectum stendendum est.

CAP. VI. CYNANCHE TONSILLARIS.

SYMPTOMATA.

Membranae fauciū mucosae praecipue tonsilarum dolor, tumor, rubor; devorandi difficultas; angustiae in faucibus sensus; oris fauicimque viscositas; auris internae dolor; assidua et molesta muci excretio; synocha; tumor primum vulgo in alterutra tonsilla comparet ubi decrescens in alteram, transit; inflamatio nonnunquam magnopere procedit ut spiritus afficiatur.

CAUSÆ.

Omnes causæ quae inflammationem producunt; frigus collo applicatum;

exercitatio vehemens oratoria ; stimuli gutturae inhaerentes ; aetas juvenilis.

DIAGNOSIS.

Ab cynanche maligna distinguitur pulsu forti ; pyrexia quae in hoc morbo synoqua est in altero typus ; ulcerum absentia.

PROGNOSIS.

Terminatur frequentissime resolutione, suppuratione , raro gangraena ; pyrexia lenis ; respiratio libera , tumor externus, fausta sunt symptomata.

CURA.

Sanguinis missio topica ; vomitoria praecipue sub morbi initium ; epispastica et rubefacientia collo admota ; alvi purgatio praecipue cum sub-muriati hydrargyri ; regimen antiphlogisticum ; garganismata aslringentia ; vaporis aquae calidae et acidi acetosi inhalatio : si mini-

tetur suppuratione fomenta et cataplasma ta-
sunt utenda ; si metuetur suffocatio ton-
sillarum scarificatio vel aetheris sulphu-
rici et aquae calidae inhalatio : An bron-
chotomia ?

CAP. VII. CYNANCHE MALIGNA.

SYMPTOMATA.

Horrores crebi , nausea , anxietas , vo-
mitus , prima sunt indicia morbi ; eodem
tempore vel brevi post , cervicis rigor ,
faucium molestia et raucedo incidunt ;
fauces alte sunt rubrae , parum tumidae ,
deglutitio parum difficultis ; mox supra
partes affectas , maculae albidae vel ci-
nereae , serpentes , coeuntes comparent ;
et fauces crustis crassis obducunt ; his
decedentibus , ulcuscula subjacentia sese
ostendunt ; nunc temporis coryza acris
humorem foetidum effundens , labia na-
resque rodit ; infantes diarrhoea tentan-
tur ; pyrexia procedente cum pulsu par-
vo , crebro et alnormi ; respiratio stre-

pens et rauca evadit, symptomata vespera adventante ingravescunt et mane remittunt; magna virium prostratio, delirium et coma superveniunt; secundo, tertiove die primo circa faciem, collumque efflorescit cutis, maculis clare rubris, serpentibus, tandem coemfibus, corpus totum obdumentibus, manibus, extremisque digitis rigentibus et tumidis: eruptio circa diem quartum plerumque disparet, et cuticula desquamatur; pyrexia, eruptione accidente vel decedente, raro imminuta; morbo procedente putredinis symptomata aceedunt, et aeger inter diem tertium et septimum vivis eripitur.

C A U S E .

Contagium.

D I A G N O S I S .

Ab eynanche tonsillari dignoscitur pulsus, deglutione parum difficulti, maculis cinereis et serpentibus, respiratione stridente et febris typo.

PROGNOSIS.

Periculum pyrexiae violentia et gangraenae proclivitate est aestimandum ; ulcerum livor ; spiritus et coryza foetide olentes ; diarrhoea violenta ; delirium et coma perdurantia ; anxietas permagna et inquietudo , funestum morbi eventum denunciant. Signa fausta sunt , mitior ulcerum species ; eruptione prodeunte febris remissio ; ea in squamulas abeunte cum altera remissione ; sudores lenes universi ; crustis a faucibus delapsis , somno , cibi desiderio et aliis bonis notis redeuntibus.

CURA.

Emetica repetita ; laxantia vel enemata lenia , alvo postulante ; putredini occurritur cinchona , vino opio , garganis matibus antisepticis et stimulantibus praeципue ex capsico annuo vel polygala senega paratis : epispatica invicem exci-

pientia ; pediluvia ; mundities summa : aeris puri libera admissio et alia remedia ad typhum graviorem aptata : ulcerum foetor , injectione frequente sulphatis aluminae in aqua soluti , amovetur , nempe prioris uncia diuinidia ad posterioris libram : An aquae frigidae corpori nudato affusio ?

CAP. VIII. CYNANCHE TRACHEALIS.

SYMPTOMATA.

Adoritur plerumque infantes lactationis tempore peracto , nonnunquam vero adulto , cum dolore ad partem tracheae superiorem obtuso , tuinore fere nullo in faucibus apparente , supervenit raucedo clangosa , loquela , tussimve comitans , quasi ex tubo metallico vox prodiret , quae galli cantui confertur ; huic accedit respirationis difficultas cum inspiratione strepente , tussis brevis , interrupta , plerumque sicca urget , si quando adsit ex-

pectoratio , ejicitur materies purulenta simbris membranaceis mixta , facies livida sit vel rubra , adsunt sitis magna , caloris sensus ingratus et inquietudo ; deglutitio parum , minimumve impeditur ; in faucibus nihil morbidi ut plurimum conspicitur , aliquando tamen tumor et rubor ; urina primo est limpida postea turbida , pulsus frequens est et debilis ; synocha : sensibus illaesis fruitur aeger , et nonnunquam cum strangulationis in faucibus sensu subito abripitur.

C A U S E.

Frigus ; atmosphaera frigida et humida ; aetas infantilis.

D I A G N O S I S.

Peculiaris vocis sono et constrictio nis circa laryngem sensu facile dignoscetur.

PROGNOSIS.

Respiratio cum strepitu valde difficultis; anxietas magna; pyrexia vehemens; infesta sunt symptomata: membranaceae materiae expectoratio, respiratio libera; vox parum mutata, fausta sunt omina.

CURA.

Hirudines quam prope parti affectae sunt admovendae; emetica, ad vomitionem, nauseamque ciendum; visicatoria; rubefacientia; refrigerantia; alvi purgatio lenis; aquae calidae vaporis inhalatio; balneum tepidum; antispasmodica praecipue moschus, ferula assae foetidae maxime sunt confidenda. Ubi hec morbo conflictati sunt adulti, sanguinis missio, et alia pro synocha remedia, abjecta procrastinatione, uti sunt. An submuriatis hydrargyri grana pauca frequenter? An polygalae senegae vel daphnes mezerei decoctum ad vomitionem postea-

que nauseam vel alvi lenem purgationem promovendum?

CAP. IX. CYNANCHE PHARYNGÆA.

SYMPTOMATA.

Rubor in imis præcertim faucibus; deglutitio maxime impedita, dolentissima; respiratio satis commoda; febris synocheasdem causas ut cynanche tonsillaris agnoscit, et eandem medendi rationem postulat.

CAP. X. CYNANCHE PAROTIDÆA.

SYMPTOMATA.

Tumor externus parotidum et maxillarum glandularum magnus, primo in maxillæ inferioris angulum comparens; respiratione et deglutitione parum laesis; febre synocha plerumque leni; faucium tumore recedente, mammae in foeminis et testes in maribus afficiuntur.

PROGNOSIS.

Pyrexia vehemens vel phrenitis tumoris mammarum vel testium retrocessioni supervenjens malum est..

C U R A.

In genere solummodo requiritur regimen antiphlogisticum ; atsi , mammarum aut testium tumore recedente , augeatur pyrexia cum phrenitidis signis vel stupore , capitis fomenta , vesicatoria , et alia ei affectioni idonea , sunt usurpanda .

CAP. XI. PNEUMONIA.**SYMPTOMATA.**

Rigore , horrore , aucto calore , aliisque synochae signis adoritur ; paucis horis elapsis subsequuntur symptomata jam jamque memoranda ; dolor lateris aeutus , fixus , pungens ; (nonnumquam

vero obtusus cum ponderis sensu) sae-
pissime sextam aut septimam costam oc-
cupans , quandoque hinc ad scapulas , il-
lic ad sternum aut claviculas jaculans ,
respiratio perpetuo difficultis sub inspira-
tione aucta , saepe non nisi trunko cor-
poris erecto exercenda ; decubitus in la-
tus affectum vel integrum molestus , non
nunquam in dorsum commodior ; tussis
major , minorve ab initio comitatur ,
primo expectoratio est nulla vel parca ,
postea materies sputo rejecta colore va-
riat et saepe sanguine tingitur , facies
tumida est et purpurei coloris ; anxietas
et inquietudo urgent , pulsus fit frequens ,
plenus , durus atque citatus , nonnun-
quam vero mollis et debilis : terminatur
resolutione , suppuratione , gangraena ,
effusio vel exudatione ab pleurae interna
superficie . Sub titulo pneumoniae , com-
plectuntur pleuritis et peripneumonia .

C A U S E.

Causae remotae sunt anni tempus certum, hyems et ver; temperamentum sanguineum; perspiratio imminuta aut suppressa; aetas inter quadraginta et sexaginta; exercitatio vehemens pulmonum; causae synocham inducentes; frigoris et caloris vices; morbi priores. Causa proxima est pleurae vel pulmonum inflammatione.

D I A G N O S I S.

Ab hepatitis dignoscitur difficili in latutus affectum decubitu, dolore non pressione aucto; singulta; partis situ.

P R O G N O S I S.

Pyrexia vehemens, respiratio valde difficultis; tussis crebra, vehemens, dolores exasperans; dolor ab altero latere in alterum transgressus; anxietas et in-

quietudo auctae ; delirium ; respiratio repente curta et celeris , infausta sunt symptomata. Materiae subflavae , spissae sanguinis aliquantulo tinctae sine tussi vehementi expectoratio libera ; haemorrhagiae naribus vel venis haemorrhoidalibus ; diarrhoea biliosa ; urina sedimentum deponens , vel eruptio erysipelatosa partes externas occupans , fausta sunt signa.

Suppuratiōnem futuram denunciant inflammationis symptomata perstantia ad diem decimum quartum , sed aliquandiu moderatius ; jam factam testantur doloris et sputi remissio , spirandi difficultate manente , horrores leves , febris hectica , tussis et dysponea auctae , decubitus in latus affectum facillimus et ponderis sensus in thorace : effusionis symptomata suffocationem inducentia sunt respiratio subito abbreviata , accelerata , non nisi trunco corporis erecto exercenda , pulsus debilis et maxime frequens.

C U R A.

Sanguinis missio cito , larga , repetita , secundum symptomatum violentiam et aegri vires , hirudines , vel cucurbitulae cruentae ad partem affectam sunt admovendae ; epispastica repetita thoraci applicata ; laxantia lenia et enemata emollientia ; diluentia tepida acido vegetabili grata reddita ; demulcentia mucilaginosa ; regimen antiphlogisticum ; vomitoria ut tartris antimonii vel ipecacuanha refracta dosi ad nauseam solummodo ciendum ; expectorantia ; aquae calidae vapores ore in pulmones sunt accipiendi ; pediluvia . Si tussis urgeat , spirandi difficultate et pyrexia subductis , opiata : aegro magnopere debilitato , guttae quinque tinturae opii hora sexta pomeridiana indies summo cum fructu datae fuerunt ; ad effusionem vel empyema digitalis . An hydrargyri preparationes cum opii pauxillo ad saliva fluxum lenem ciendum ?

CAP. XII. PERIPNEUMONIA NOTHA.

SYMPTOMATA.

Adsunt frigus , calorque alternatim ; lassitudo , tussis humida , muci viscidii , opaci expectoratio , dolores obtusi seu potius ponderis et angustiae sensus in aliqua thoracis parte , capitis dolor immanis nonnunquam vomitus ; dyspnoea ; vulrus rubescens , vertigo vel somnolentia ; pyrexia plerumque nulla vel mitis.

CAUSÆ.

Anni tempus ver et autumnus ; aetas senilis ; subitae coeli mutationes ; catarri priores.

DIAGNOSIS.

A pireumonia cognoscitur pyrexia miti vel omnino absente , dolore , calore , sisticue minus violentis : ab asthmate di-

(41)

gnoscitur , dyspnoea minus vehementer et ea non per intervalla subeunte.

PROGNOSIS.

Pyrexia vehemens subito invadens maximo periculo stipatur.

CURA.

Venae sectio plerumque obest , nisi dyspnoea et angustiae sensus urgeant ; emetica tali quantitate data ut nausea moveatur ; epispastica invicem excipientia thoraci admota ; laxantia tenia et enemata ; diluentia ; expectorantia ; balneum tepidum ; digitalis ?

Carditis , pulsus intermitente , syncope et palpitatione cognoscitur. Diaphragmitis , dolore circa costas inferiores , cinguli instar ventrem supra lumbos ambientem , respiratione maxime difficulti , quiescente abdomen , solo thorace peracta , delirio perpetuo , et risu sardonico , stipatur.

Peritonitis stipatur pyrexia : dolore abdominis corpore erecto aucto ; absque propriis aliarum phlegmasiarum abdominalium signis. Hi morbi eandem medendi rationem postulant quae pneumoniae est idonea.

CAP. XIII.. GASTRITIS.

SYMPTOMATA..

Dolor ardens , fixus , pungens in ipso stomachi loco ; ejus exacerbatio in ipso punto , quo aliquid ei ingeritur ; vomitus dolentissimus statim ab omni inge- sto , singultus dolorificus , anxietas summa et perpetua circa praecordia , summa virium prostratio , pulsus durus et parvus , sitis magna , febris acuta continua : est ubi urina supprimitur.

C A U S E..

Aquae frigidae ingurgitatio corpore calefacto ; vis externa ; acria ingesta ; ni-

mia ejus distentio ; exanthemata retro-pulsa.

DIAGNOSIS.

Signa pathognomonica sunt epigastrii dolor ardens et tumor ; vomitus crucians et eructatio ; magna virium prostratio ; singultus .

PROGNOSIS.

Si dolor gradatim remittit , et pulsus magis plenus et mollis evadit , resolutio est expectanda ; minitatur suppuratio si symptomata per ebdomadam persistere etiamsi mitiora cum rigoribus et doloris remissione , anxietate , sensuque gravativo manente ; si , remedii valentissimis in auxilium vocatis , pyrexia , dolor atque calor ingravescant , gangraena est timenda , et gangraenae inceptae signa sunt doloris et caloris subita cessatio , regionis epigastricae flacciditas ; pulsus vix numerandus et intermittens : debilitas aucta ; delirium .

C U R A.

Missio larga , et repetita sanguinis (non nos detergere pulsus parvus debet) postea hirudines ; cucurbitae cruentae et vesicatoria partí affectae sunt admodum vendae ; abdominis fomenta ; pediluvia ; enemata laxantia et emollientia ; diluentia blanda parva copia ; dolore et vomitu per intervalla solummodo redeuntibus , opiate.

Inflammatio Erysipelatosa signis sequentibus stipatur ; calor , dolorisque sensus in ventriculi regione ; vomitus ; anxietas ; anorexia ; pyrexia mitis ; non nunquam in fauibus appetit eruptio erysipelatosa quae saepe per totum canalem alimentarium est diffusa ; eodem tempore omnibus ingestis acris ventriculo inusitata est sensilitas ; diluentia blanda et tepida solummodo postulantur ni altera gastritis species minitetur : si morbos putridos comitetur , acida , antisепtica , tonica sunt usurpanda : an , om-

nibus incassum tentatis , balneo frigido ,
immersio ?

CAP. XIV. ENTERITIS.

SYMPTOMATA.

Dolor abdominis acutus , fixus , urens ,
tanctu auctus ; tensio perquam molesta
praecipue circa umbilicum ; nausea ; vo-
mitus ; sitis magna ; alvus pertinaciter
astricta ; febris acuta ; pulsus frequens ,
durus et contractus ; urina valde rubra ;
nonnunquam singultus .

CAUSÆ.

Easdem agnoscit causas ac gastritis ;
hernia incarcerata ; volvulus ; colica ; fri-
gus abdomini applicatum .

DIAGNOSIS.

Ab hepatitis dignoscitur doloris ab-
sentia ad summum humeri jaculantis : ab

gastridite dolore torquente et urente circa umbilicum : ab colica , pyrexia et pulsu.

PROGNOSIS.

Signa fausta sunt , dolores migrantes , sensimque cessantes ; venter ad tactum minus dolens ; alvus clysmatibus respondens ; sudores calidi atque profusi ; pulsus plenus et mollis ; urinae turbatae copiosa demissio. Infausta sunt , ventris tormenta saeva ; abdomen tensum , tactumque refugiens : alvus pertinaciter clausa ; urinae suppressio ; livor circum labia ; singultus perpetuus ; delirium ; subsultus tenditum ; convulsiones.

CURA.

Sanguinis missio generalis et topica ; laxantia ; enemata emollientia ; refrigerantia ; abdominis fomenta ; semicupium ; vesicatoria ; diluentiam blanda : an opista per anum injecta ? an balneum frigidum , rebus ad extremum redactis ?

CAP. XV. HEPATITIS.

SYMPTOMATA.

Pyrexia; **hypocondrii dextri ardor**; **tensio**, **dolor**, **saepe pungens pleuritici instar** saepius obtusus et hypocondrio presso auctus; **dolor ad claviculam et summum humeri dextri**; **decubitus in latus sinistrum difficultas**; **spirandi difficultas sub inspiratione aucta**; **tussis fere sicca**; **anxietas**; **nausea**; **vomitus biliosus**; **alvus plerumque astricta**, **urina parca**; **ruberrima**; **color faciei oculorumque subflavus**; **pulsus frequens**, **fortis et durus**; **singultus**: Quando afficitur superficies convexa, dolor magis est lancinans; tensio major percipitur; tumor saepe observatur; dyspnoea singulatuer magis violentis: Quando pars concava afficitur; dolor minus pungens est; respiratie magis libera; sed anxietas, nausea et vomitus magis premunt.

CAUSE.

Omnis inflammationem producentes ; tubercula schirrosa ; hepatis adhaesiones ; vis externa ; concretiones biliariae in ductibus biliariis et vesica fellea ; affectus animum subito deptimentes ; regiones calidac.

DIAGNOSIS.

Ab pneumonia dignoscitur , dolore minus acuto et eo ad claviculam et summum humeri dextri ascende : dolore pressu aucto ; decubitu in latus sinistrum diffici : nilis vomitu ; tussi , dyspnoea que minus violentis : ab splenitide tumoris et doloris situ : ab enteritide doloris torquentis circa umbilicum absentia.

PROGNOSIS.

Periculum secundum suppurationi vel gangraenae proclivitatem dijudicabitur ,
qua-

quarum appropinquatio signis antea recensisitis cognoscetur; haemorrhagiae naribus vel venis haemorrhoidalibus; sudores copiosi vel diarrhoea biliosa saepe morbum fauste solvunt.

CURA.

Sanguinis missio generalis et topica; epispastica parti affectae; cathartica mitia et enemata; fomenta; diluentia; refrigerantia; tartris antimonii portiunculis ad nauseam ciendum; regimen antiphlogisticum: morbo in suppurationem excun-
te, abscessus, si exteriora versus pro-
trudat, cataplasmata et fomenta sunt
utenda. In India Orientali curatur aci-
do nitrico, vel hydrargyro interne et
externe adhibito, donec excitatur sali-
vatio.

CAP. XVI. HEPATITISCHRONICA .

CHARACTER .

Haec saepe nulla quibus dignoscatur signa praebet , aliquando tamen eandem adesse suspicari potest , ex hepatitis causis quibusdam praegressis , ex sensu quodam plenitudinis et gravitatis in hypochondrio dextro , ex doloribus plus minusve pungentibus in eadem parte subinde perceptis , ex dolore quodam a presso hypocondrio dextro vel a decubitu in latus sinistrum sentito , et deinde ex pyrexia leviori cum dictis signis subinde infestante .

CURA .

Hydrargyrus interne et externe est administrandus donec excitatur lenis salivatio , tonicis et amaris conjunctis praecipue cinchona et ferri praeparationibus . An acidum nitricum vel nitrosum ?

CAP. XVII. SPLENITIS.

CHARACTER.

Pyrexia ; hypochondrii sinistri tensio , calor , tumor , et dolor pressu auctus ; absque signis nephritidis .

Facile dignoscetur ab ullo alio morbo signis supradictis , et curatur medis sub hepatitide memoratis .

CAP. XVIII. NEPHRITIS.

SYMPTOMATA.

Pyrexia ; dolor acutus , pungens sae-
pius obtusus in regione renis , saepe
ureteris iter sequens ; mictio frequens
urinae vel tenuis decoloris , vel ruber-
rimae ; vomitus bilis variae ; ructus as-
siduus ; cruris stupor ; testiculi ejusdem
lateris refractio aut dolor .

C A U S E .

Hanc producunt omnes causae generales inflammationis ; diuretica acria ; vulnera et contusiones renata ; equitatio diuturne et vehemens ; faeces industratae colo ; decubitus in dorsum diutinus ; podagra retrocedens vel atonica ; calculi.

DIAGNOSIS.

Ab lumbagine dignoscitur mictione frequenti , dolore ureteris iter sequente , et nequaquam aucto truncum erigendo : ab nephritide calculosa , pyrexia dolorem comitante primo ab insultu .

PROGNOSIS.

Dolores sensim cessantes ; urina copiosa et crassa ; sudor calidus per totum corpus diffusus ; sanguinis fluxus ab vasis haemorrhoidalibus faustum morbi

eventum denunciant. Dolor in loco pulsans sternutamento auctos , pyrexia aucta ; crebrum meiendi desiderium ; dysuria ; dolor subito cessans ; singulatus ; delirium ; infesta sunt sigua.

CURA.

Sanguinis missio generalis et localis ; laxantia lenia et enemata repetita ; demulcentia blanda ; rubefacientia ; tonicitat ; semicupium ; regimen antiphlegmaticum ; diaphoretica lenia ; ex gentianis antimonii et similia refracta dosi ; pyrexia et dolore multum levatis opiata.

CAP. XIX. HYSTERITIS.

SYMPTOMATA.

Pyrexia ; hypogastrii calor , tensio , tumor et dolor ; os uteri tactui dolens ; stranguria ; tenesmus ; vomitus ; alvus primò astricta , postea fusa.

PROGNOSIS.

Magna virium prostratio ; vultus erubescens ; rigores frequentes et abdominis tumor , infausta sunt symptomata : diaphoresis lenis ; lochiorum fluxus ; abdomen minus tensum et lactis secretio , fauste sunt notae .

CURA.

Sanguinis missio generalis et topica ; abdominis fomenta ; diaphoretica lenia , qualia , ipecacuanha vel tartris antimoniī opio conjuncta ; laxantia lenissima ; diluentia blanda ; diaeta blanda et nutritiens.

CAP. XX. CYSTITIS.**SYMPTOMATA.**

Pyrexia ; dolor assiduus , ardens , pungens in loco vesicae ; tumor , mictio fre-

queps dolorifica vel ischuria ; vomitus ; tenesmus .

CAUSE.

Omnis infiammationem producentes ; calculus ; vicinorum inflammatio , etc.

CURA.

Medendi ratio eadem est in hac ut in nephritide ; diluentibus parce haustis.

CAP. XXI. RHEUMATISMUS.

SYMPTOMATA.

Pyrexia ; dolores acuti , lancinantes circa articulos , musculorum tractum sequentes , frequenter migrantes , genua et reliquos majores , potius quam pedum vel manuum articulos , infestantes ; calore externo , motuve acuti ; partis affectae tumor , rubor et tensio ; urina ruberrima ; alvus constipata , pulsus fre-

quens , plenus atque durus ; sanguis de-tractus crustam coriaceam exhibens ; no-cte adventante ingravescunt omnia sym-ptomata .

C A U S E.

Plethora ; coeli subitae mutationes ; frigus corpori calefacto admotum : ver et autumnus. Causa proxima est mem-branarum et expansionum aponeurotico-rum tendinum inflammatio.

D I A G N O S I S.

Ab arthritide dignosgetur dolore mu-scularum tractum sequente et nulla ven-triculi affectione antecedente.

P R O G N O S I S.

In genere faustè terminatur sudore copioso et universali ; urina sedimentum lateritium deponente ; diarrhoea ; haemor-rhagia vel eruptione cutanea .

Regimen antiphlogisticum ; missio sanguinis generalis et topica ; cathartica mitia et encemata ; refrigerantia praecipue sales medii ; diluentia ; diaphoretica , qualia , tartris antimoniī , refracta dosi , aqua acetitis ammoniae , et pulvis ipecacuanhae compositus ; rubefacientia et dolore fixo epispastica ; venaesectio ne ultra justos limites est institueudam tardam efficiet convalescentiam. An digitalis ? An cinchona praecipue si sub intermittentis typo compareat morbus , vel post primarum viarum , cum sulphureti antimoniī praeparationibus , eva-
cuationem ?

CAP. XXII. RHEUMATISMUS CHRONICUS.

CHARACTER.

Post rheumatismum , nisum violentum vel subluxationem ; dolores artuum vel muscularum , sub motu praesertim aucti , plus minusve fugaces , calore lecti vel alio externo levati ; artus debiles , pallidi , rigidi , facile et saepe frigescentes ; pyrexia nulla ; tumor plerumque nullus .

C A U S E.

Rheumatismus acutus prior et plurimae causae rheumatismum acutum producentes . Causa proxima est atonia , rigiditas et contractio fibrarum muscularium et vasorum extreborum .

C U R A.

Stimulantia interna, qualia, oleum volatile pini purissimum , guaiaci officinalis resina , anthemis pyrethrum , cochlearia armoracia et sinapi ; tonica praecipue cinchona ; stimulantia externa ; frictio ; electricitas ; exercitatio ; balneum calidum ; calor externus ; rubefacientia ; epispatica ; diaphoretica ut pulvis ipecacuanhae et opii ; opium et sub murias hydrargyri , singulorum granum unum per decem vesperas : hydrargyrus ad solummodo salivationem non excitandum .

CAP. XXIII. PODAGRA.

SYMPTOMATA.

Morbus haereditarius, oriens sine causa externa evidente , sed praeeunte plerumque ventriculi affectione insolita; hora secunda post medium noctem plerumque invadente cum pollicis pedis vel ar-

ticuli dolore , quandoque verò calcanei
 aut tali , ossium luxationem referente ,
 cum sensu quasi aquae tantum non fri-
 gidae parti affectae affusae; mox sequun-
 tur rigor , horror et pyrexia , dolor au-
 tem intenditur (rigore atque horrore
 sensim recedentibus) donec tandem sub
 noctem sequentem ad apicem pervene-
 rit ; tunc gradatim cessat , et aëget le-
 ni madore perfusus somno concedit , a
 quo evigilans , partem affectam tumore
 et rubore occupatam cernit , per dies
 plures febris , dolorque die advespera-
 scente redeunt , levantur autem sub gal-
 li cantu ; appetitus prostratus , totius
 corporis sub vesperam rigor , gravitas
 et sensatio molestia paroxysmum comi-
 tantur . Recedentem paroxysmum exci-
 pit pedis affecti pruritus vix ferendus
 cum cuticulae desquamatione ; morbo
 jam discesso aeger per longum tempus
 valetudine secunda fruitur .

CAUSÆ.

Causæ praedisponentes sunt ; labes haereditaria ; plethora ; vitae æme ; venus immodica : causæ occasioales sunt, usus cibi animalis et conditorum immodicus ; vinum aliquique liquores spirituosi nimis liberaliter adhibiti ; studium nimium ; vita sedentaria ignava ; evacuationes suppressae ; caput magnum ; vigilia diuturnior ; exercitatio violenta ; praecipue ambulatio ; frigus extremitis inferioribus applicatum.

DIAGNOSIS.

Ab rheumatismo cognoscitur dolore minores articulos aggrediente et ibi manente ; si quando transfertur ex uno pedis pollice , alterum aggreditur ; partis laborantis timore et rubore ; ventriculi affectione antecedente .

PROGNOSIS.

Hoc malum raro periculum differt, ni ventriculus, caput et partes vitae inservientes afficiantur.

C U R A .

Venaesectio generalis plerumque obest; parti affectae hirudines aliquando prodesse possunt, sed optima remedia sunt lanula et patientia, cibo animali et liquoribus omnigenis spirituosis abstinentia, ni vitae cursus vel atoniae signa aliter postulant: si tumor, rigorque post paroxysmum permaneant, strigilis assidue est utenda. In intervallis, ab omnigenis liquoribus fermentatis abstinentia; exercitatio medica, praecipue ambulatio vel equitatio; cathartica ex oleo e seminibus ricini, aloe perfoliata, rheo palmato, sulphure sublimato, sapone et similibus, parata, ad alvum astrictam praeveniendum: tonica, qualia, cincho-

na , quassia et ferri praeparationes , et sales alkalini : symptomatum violentia imminuta , opiate . An florente aetate , viribusque minime labefactis , prima morbi accessione , sanguinis missio , laxantia lenia , emetica , et partis affectae aurae frigidæ expositio ?

CAP. XXIV. PODAGRA ATONICA.

SYMPTOMATA.

Podagra atonica , cum ventriculi vel alius partis internae atonia , et vel sine expectata aut solita artūr inflammatiōne , vel cum doloribus artuum lenibus tantum et fugacibus , et cum dyspepsia vel aliis atoniae symptomatibus , subito saepe alternantibus ; alvo modo astricta , modo soluta cum doloribus colicis ; thoracis visceribus nonnunquam affectis , cordis palpitationem , syncopen et asthma producentibus : capite quoque affecto , cephalalgia , vertigo , apopletici et paralytici affectus producuntur .

CURE.

Evitatio studiosit causarum omnium quae corpus debilitant : exercitatio modica , balneum frigidum si corpus sub ejus usu potenter stimuletur ; cibi animalis , vini minime acescentis vel spiritus ardentis aqua commissi modicus usus ; tonica et cathartica modo memorata sunt utenda. Dyspepsiæ signa emeticis mitissimis sunt sublevanda : fontanellas inseri et frigus evitari opus est.

CAP. XXV. PODAGRA RETROCEDENS.

SYMPTOMATA.

Inflammatio ad articulos more solito se prodit, sed ad doloris eundem gradum non ascendit nec tempus assuetum perstat nec sensim decedit, sed repente cessat excipiente partis internæ cujusdam affectu molesto : inter partes internas nulla frequentius afficitur quam ven-

triculus , unde anxietas , aegritudo magna ; vomitus aut dolor vehementis frigore risque sensus oriuntur ; cor nonnunquam afficitur , unde syncope : interdum pulmones , unde asthma : quandoque caput , unde apoplexia vel paralysis.

C U R A .

Si ventriculum afficiat , protinus succurrendum est vino generoso liberaliter dato et aromatibus calefacto ; si non satis valida sint , spiritas ardentes , aether sulphuricus , spiritus ammoniae succinatus et similia sunt usurpari ; ubi morbi impetus non valde vehementis est , tinctura ferulae , assaefotidae , carbonas ammoniae ; moschus ; confectio opiate etc. : si comitetur vomitus sub initio vi- no calido primum aqua commisto dein mero promovendus est postea opiate : si comitetur diarrhoea jusculum tenue , postea opiate : si pulmones occupet , opiate , antispasmodica , epispatica : quando caput impedit , remedia verisimilli-

ma sunt episistica , Kali purum collo admotum foret vel capiti , extremisque partibus , et crurum cum sinapeos pulv- vere frictio ; eodem tempore aromata , carbonas ammoniae et similia dari possunt.

CAP. XXVI. PODAGRA HABER- RANS.

CHARACTER.

Partis internae inflammatio , vel non praegressa vel praegressa et subito recedens artuum inflammatio.

C U R A.

In tali casu oportet morbum venae-sectione , caeterisque remediis , quae idiopathicae ejusdem partis inflammationi convenient , tractari.

ORDO III. EXANTHEMATA.

CHARACTER.

Morbi contagiosi , semel plerumque tantum in decursu vitae aliquem afficienes ; cum febre incipientes ; definito tempore apparent phlogoses , saepe plures , exiguae per cutem sparsae.

CAP. I. VARIOLÆ BENIGNÆ.

SYMPTOMATA.

Circa meridiem rigore , horrore atque languore invadunt , quos excipiunt calof , dolor capitis dorsi et epigastrii (praecipue digito premente) , nausea , vomitus , et somnolentia ; adveniente erupzione infantes nonnunquam convulsionibus afficiuntur ; tertio plerumque die pustulae quaedam discretæ erumpunt primo in facie et serie in totum corpus ; symptomata tunc levantur , et quinto

die , eruptione finita , cessant omnino ; pustulae indies conicae crescunt , primo subalbidae tunc flavae evadunt , interstitia valde rubescunt : intumescit facies et oculi nonnumquam clauduntur , circa diem undecimum magnitudinem summam attingunt et in crustas abeunt : faciei tumor subsidet , manus pedesque exinde tumescunt . Quando pustulae non admodum paucae sunt , deglutiendi difficultas , raucedo et salivatio circa diem sextum vel septimum superveniunt , et febris decimo plerumque die iterum apparet ; sed haec omnia symptomata , cum faciei tumor subsidet et pustulæ arcuscunt , abeunt omnino .

C A U S E .

Contagium specificum.

D I A G N O S I S .

Dolor epigastrio presso et alia signa , variolas ab aliis morbis dignoscent , et præcipue si epidemicè regnent .

Regimen antiphlogisticum stricte est adhibendum, praecipue aer frigidus et purus libere est admissus, cathartica mercurialia ante diem quintum sunt administranda; aqua frigida et diluentia refrigerantia acidis grata reddita libere: crurum fatus: si urgeat diathesis phlogistica venasectio et postea vomitorium: si accedant convulsiones, opiate: si eruptione finita urgeat pyrexia, cathartica lenia et sulphureti antimoniij praeparationes ad nauseam movendum uti sunt: si fauces multum tumidae sint epispatia collo et gargarismata; si magna sit debilitas cinchona, vinum: post diem quintum opiate semel vel bis indies summo cum fructu sunt administrata.

CAP. II. VARIOLÆ MALIGNÆ.

SYMPTOMATA.

In his pyrexia vehemens, vomitusque plerumque perpetuus ante eruptionem urgent, pulsus frequens, debilis, contractus et convulsiones nonnunquam violentae comitantur; diarrhoea nonnunquam eruptionem praecedit, et ad diem unum alterumve post illam protrahitur; die plerumque secundo pustulae numerosae, circumscriptione parum regulares, pallidae, minime elevatae et in vesiculas coeuntes sese ostendunt; symptomata post eruptionem praeter vomitum omnia manent, in morbi progressu ingravescunt symptomata febrilia et delirium vel coma supervenit; facies immode dicetum, deglutiendi difficultas, fauum-molestia et salivatio maxime urgent; in infantibus diarrhoea salivationis vicem praestat; pustulae in matu-

rationen tendentes ; plaene fiunt et flaccidae , quarum acumina saepe cavantur, punctaque nigra videntur ; in suppurationem veram nunquam procedunt , sed humorem effundunt , et in crustas fuscas vel nigras abeunt , foveolis in cute relictis ; erysipelas eruptionem saepe praecedit vel comitatur : in morbo violento petechiae ; urina sanguine tincta et haemorrhagiae frequenter videntur.

PROGNOSIS.

Dolor lateris vel ventriculi acutus post eruptionem ; tumor faciei repente desideus ; pustulae valde confluentes super faciem et thoracem ; deglutiendi vel spirandi maxima difficultas delirium ; petechiae , magna virium prostratio ; haemorrhagiae et alia putredinis signa , infastae sunt notae.

C U R A.

Vires cinchona , vino , opio , acidis mineralibus , cardiacis et diaeta nutriende sunt sustentandae , et epispatica affia que remedia typho idonea , libere sunt , adhibenda : an , ante pustularum eruptionem , si cutis sit praeter naturam callida , cum aliis morbi violenti symptomatibus , aquae frigidae corpori nudato affusio ? an emetica si minitetur strangulatio ?

CAP. III. VARICELLA.

CHARACTER.

Pustulae post brevem febriculam crumpentes , in pustulas variolae similes , sed vix in suppurationem euntes ; post paucos dies in squamulas , nulla cicatrice plerumque relictas , desinentes .

DIAGNOSIS.

Ab variolis dignoscitur pyrexia miti, eruptione primo in tergum comparente, et quarto vel quinto die in squamulas abeunte.

CURA.

Hic morbus periculi expers, raro medentis opera indiget; desquamatione finita catharsis lenis est propinanda.

CAP. IV. RUBEOLA.

SYMPTOMATA.

Hunc morbum antecedunt pyrexia, rigor, calorque alterni; anorexia, nausea, vomitus saepe diarrhoea, ab initio tussis plerumque sicca, raucedo, dyspnoea, sternutatio capitis, oculorum gravido, somnolentia continua, stillicidium humoris acris ex oculis cum tumore,

d

ardore et rubore palpebrorum et coryza comitantur ; eruptionem protinus praecedunt anxietas ; praecordiorum oppressio et pruritus faciet molestus ; quarto plerumque die primum in facie , papulae exiguae , rubrae , morsus pulicium reddentes , gradatim coeuntes vix supra cutem eminentes , comparent , et in corpus totum sese serie diffundunt ; post sex dies in squamulas furfuraceas minimas abeuntes . Signa (praeter vomitionem) eruptione ad finem perducta non levantur , sed per totum morbi cursum manent et desquamatione inclinata , ingravescunt pyrexia , dispnoea , tussis , somnolentia aliaque symptomata , et urget plerumque diarrhoea .

C A U S A :

Contagium specificum.

DIAGNOSIS.

Sternutatio; coryza; humoris ex oculis stillicidium; tussis et dyspnœa hunc morbum ab omni alio dignoscent.

PROGNOSIS.

Signa fausta sunt pyrexia, dyspnœaque initis; eruptio maturè apparens, diarrhoea lenis; diaphoresis modica; expectoratio libera atque copiosa. Infausta, sunt, vomitus post eruptionem perseverans; pneumonia diarrhoea symptomatica stipata; tassitudo magna; dolores graves, fixi, eruptionem antecedentes; dolor capitis et oculorum permanens; petechiae; papulae subito retrocedentes, praesertim si hisce succedat pneumonia, cynanche vel delirium.

Sanguinis missio generalis et localis , secundum pyrexiae , tussis et dyspnoeae violentiam , sed raro ante desquamationem postulatur ; cathartica , qualia , phosphas sodae , super-tartris potassae , cassia senna , tamarindus indica , etc. enemata laxantia ; diaphoretica lenia , e. g. tartris antimonii tali dose ut nauseam moveat ; sales medii ; diluentia tepida ; demulcentia blanda ; expectorantia mitia ; pediluvia ; epispatica lateri et inter scapulas ; si non urgeat diathesis phlogistica , opiate : morbo finito cathartica repetita : si superveniant pneumoniae signa , venaesectio aliaque remedia ei aptata : si vexet diarrhoea sanguinis missio : si putredinis signa sese ostendant cinchona , vinum , confectio aromatica etc. libere sunt propinanda.

CAP. V. SCARLATINA.

SYMPTOMATA.

Ineunte hieme plerumque se ostendit, cum frigore febrili et alii synochae sigois, quarto morbi die facies aliquantum tumet; simul in certe passim comparet rubor floridus, maculis amplis tandem coalescentibus, post tres dies in squamulas furfuraceas abiens; superveniente dein saepè anasarca; cito plerumque decedente.

CURA.

Regimen antiphlogisticum, frigore et calore ex aequo evitatis: desquamatione absolute alvi purgatio; si infantibus superveniant convulsiones vel coma, epispastica, opiate.

CAP. VI. SCARLATINA AN-
GINOSA.

SYMPTOMATA.

Lassitudo inusitata , animi dejectio , cephalalgia ; gutturis angustia ; musculorum cervicis rigidas ; horror , rigor ; aliaque pyrexiae signa sese ostendunt ; secundo die deglutiendi difficultas , anorexia , nausea . saepe vomitus superveniunt ; respiratio fit crebra , suspiriis interrupta ; anhelitus est calidus atque urens ; cutis arida , calida , pungens et inquietudo magna vexant ; pulsus frequens , parvus , debilis ; alvus nec astricta nec soluta ; tonsillae tument , rubent et nonnunquam crustis albidis obducuntur ; tertio plerumque die , rubor floridus pressu evanescens , sed cito rediens in corpus totum comparet ; cutis laevis est et tumida ; nonnunquam maculae letae ; lividae , paucae circa pectus sese ostendunt ; post tres dies cutis desquamatio

plerumque accedit, superveniente dein
saepe anasarca.

G A U S A.

Contagium.

DIAGNOSIS.

Ab morbillis distinquitur; tussis, con-
ryzae, epiphotoe et sternutationis absentia;
ab variolis dolore epigastrio presso,
absente.

PROGNOSIS.

Delirium; oculi inflammati et splen-
didi; efflorescentia cito apparet; dia-
rhoea; infausta sunt symptomata.

C U R A.

Obest plerumque sanguinis missio;
emetica repetita summo cum fructu utun-
tur; cardiaca, e. g. contrayerva, mi-

stura camphorata etc.; diuretica ut carbonas potassae, carbonas ammoniae: gargarismata: diaphoreticapraecipue tartuſ antimonii refracta dosi ad nauseam movendum; prædiluvia; balneum tepidum; regimen antiphlogisticum; postea cinchona, ferri præparations: si permanserit debilitas cum comate, episistica: ad anasarcam, scilla maritima, submuriæ hydrargyri, sales alkalini, digitalis; et ea affectione amota, tonica, ut cinchona, vinum, ferri præparations, diaeta nutriend et exercitatio: an aquæ frigidae corpori nudato affusio? An acida mineralia et vigeſabilia diaphoresi leni primo excitata?

CAP. VII. PESTIS.

SYMPTOMATA.

Eodem plerunque modo quo typhus gravior incipit; frigoris paroxysmi gravius aegrum adoriuntur quam in febre continua contingit; ingens partium in-

ternarum excipit calor ; aeger torpedine quadam , mentis stupore , aurium tintinnu , capitis gravedine , ebrii instar, afficitur : vultus horrore plenus , oculi rubri , vagi atque prominentes , capitis dolor immanis, vigiliae , delirium et interdum coma comitantur ; ingens supervenit virium prostratio , animi dejectio et solicitude ; praecordia oppressa , respiratio difficilis , nausea perpetua atque vomitus biliosus , dejectiones biliosas , foetidae , miserum torquent : pulsus frequens , debilis , abnormis saepe tamen magis durus et plenus evadit ; sitis immodica est ; lingua plerumque albida , haud raro nigra ; urina pallida et cruda vel rubra et turbida ; aut citius aut serius bubones , (partis pruritu praecedente) vibices , carbunculi atque petechiae comparent , et aeger syncope , tendinum subsultu et convulsionibus tentatur.

Contagium .

PROGNOSIS.

Signa fausta sunt, aegri vires haud multum depressae; lenis et universus sudor cum pulsu valido et regulari, anxietatem, nauseam et vomitum tollens; bubonum et carbunculorum eruptio morbi levamine comitata: Infausta sunt; calor immodece intensus; sudores profusi corpus debilitantes; petechiae nigrae, latae cito conspicuae; magna et subita virium prostratio.

CURA.

Venae sectio caute est celebranda; vomitoria, ad vomitionem semel et postea nauseam ciendum; diluentes; refrigerantia; regimen antiphlogisticum; mundities summa et cubiculi perpetua ventilatio; cinchona, vinum et alia typho graviori idonea; aqua frigida libere est bibenda: corporis totius cum oleo olive frictio: an aquae frigidae affusio?

an hydrargyri praeparationes ad saliva*e*
fluxum lenem ciendum?

CAP. VIII. ERYSIPELAS.

SYMPTOMATA.

Pyrexia , somnolentia , delirio vel comate , stipata ; pulsus frequens , plenus est et durus : secundo , tertiove die comparet eruptio coloris rubicundi , pressione evanescens , ambitus inaequalis , serpens , faciem , collumque operiens ; tumor evidens , palpebras nonnumquam occludens , dolor urens , in cuticulae squamulas , phlyctaenas vel vesiculas abiens ; faciei inflammatione apparente pyrexia non semper remissionem patitur , sed saepe cum inflammatione ingravescit et dies octo vel decem durat ; palpebrae nonnumquam in suppurationem tendunt ; comate et delirio ingravescientibus , aeger die septimo , nono vel undecimo mortalitatem explet .

C A U S A .

Sensibilitas et irritabilitas auctae ; frigus ; acria aliena applicata ; evacuaciones solitae suppressae ; erysipelatis priores insultus .

D I A G N O S I S .

Ab scarlatina anginosa , faucium tonsillarumque dolore , rubore et tumore dignoscitur .

P R O G N O S I S .

Pyrexia vehemens ; coma vel delirium perpetuum infausta sunt signa ; sine crisi evidente fauste terminatur morbus .

C U R A .

Sanguinis missio si adsit diathesis phlogistica ; emetica , ad vomitionem , nau-seamque ciendum ; regimen antiphlogi-

sticum ; diluentia ; applicationes topicae, e. g. avenacea farina ; amyrum ; folia brassicae etc. : si delirium vel stupor urgeat ; capiti fomenta et epispastica : si putredinis sit symptoma , vinum ; opium ; cinchona ; caput erecte est tenendum : an moschus et carbonas ammoniae largis dosibus si timenda sit gangraena ? an cinchona larga dosi omni in morbi stadio ?

CAP. IX. MILITARIA.

SYMPTOMATA.

Synochus : dolor plerumque pectoris ; anxietas ; suspiratio frequens ; sudor oli-
dus ; punctiones cutis ; incerto morbi
die erumpunt papulae rubrae , exiguae ,
milii seminiis magnitudine per totam
cutem , praeter faciem , crebrae ; qua-
rum apices , post unum vel alterum diem ,
pustulas minimas , albas , brevi manen-
tes , in squamulas abeuptes , ostendunt .

C A U S E .

Debilitas ; regimen calidum , puerperium .

D I A G N O S I S .

Ab omnibus alijs exanthematibus sudore nido dignoscetur .

P R O G N O S I S .

Petechia inter papulas erumpentes , magna debilitas vel putredinis signa , eruptio retracedens , delirio vel comate superveniente infausta sunt signa .

C U R A .

Regimen antiphlogisticum praecipue aeris frigidi libera admissio ; si debilitas , coma vel putredinis signa concomitantur , chinchona , vinum , opium et epispastica ; si adsit diathesis phlogistica venaesectio etc.

CAP. X. URTICARIA.

CHARACTER.

Die secundo rubores maculosi, urticarum puncturas referentes, interdiu ferre, evanescentes, vespere cum febre redeuntes, et post paucos dies in squamulas minutissimas abeuntes.

CURA.

Regimen antiphlogisticum, medicamentis vix unquam indiget; post desquamationem alvi lenis purgatio.

CAP. XI. PEMPHIGUS.

SYMPTOMATA.

Pyrexia; primo, secundo, tertiove morbi die, in variis partibus internis et externis pruritu praecedente, erumpunt vesiculae, umore subflavo plenae, avel-

lanac magnitudine, tres quatuorve dies manentes, et tandem ichorem tenuem effundentes.

C U R A.

Primae vie vomitorio et alvi purgatione sunt evacuandae; postea tonica; cardiaca; antiseptica; gargatismata.

C A P. XII. APHTHÆ.

C H A R A C T E R.

Lingua tumidiuscula; linguae et fauciū color purpurascens; escharae in fauclibus et ad linguae margines primum comparentes, os internum totum, nonnunquam etiam canalem alimentarium occupantes, albidae aliquando discretæ, saepe coalescentes, abrasae cito renascentes, et incerto tempore manentes, pyrexia plerumque mitis.

C U R A.

Absorbentia ; laxantia mitia ; emetica lenia nonnquam prosunt ; applicationes topicae , quales boratis sodae scrupuli duo aut drachma ad mellis unciam , cuius pauxillum penicillo frequenter est utendum ; morbo ingravescente , cardica ; cinchona ; opiate ; epispatica .

ORDO IV. HÆMORRHAGIA.

CHARACTER.

Pyrexia cum profusione sanguinis absque vi externa ; sanguis missus ut in phlegmatisiis apparet .

CAP. I. HÆMORRHAGIA.

SYMPTOMATA.

Plura vel pauciora e signis sequentiibus saepissime sanguinis profluvium an-

cedunt, plenitudo, tensio, ardor vel
gravitas partis ipsius vel vicinae, frigo-
ris sensus modo levis, modo gravis ac-
cedit, eum concomitantur plus minusve
horroris et rigoris, nonnunquam nausea
et vomitus; haec signa sensim decedunt
et calor praeter naturam auctus excipit,
pulsus fit frequens, citatus, plenus,
validus atque durus, et sanguis prorum-
pit: sanguis missus ut in plegmatis ap-
paret.

C A U S E.

Plethora universa; evacuationes soli-
tae imminutae vel suppressae; confor-
matio partium prava; animi pathemata,
violenta; calor externus; exercitatio vio-
lenta; ligaturae; omnia quae circulatio-
nem sanguinis accelerant; frigus exter-
ne admotum.

C U R A.

Regimen antiphlogisticum stricte est administrandum, calor externus praecipue est evitandus; refrigerantia praecipue acida; nitras potasse et infusum rosae gallicae; potus frigidi; sanguinis missio; emetica; epispatica; astrin-gentia praecipue sulphas alumine, mimosa catechu, frigus externum: si dia-thesis phlogistica fuerit sublata, opiate; Reditus ejus, diaeta parciore minusque nutritive; exercitatione modica: praecipue gestatione, equitatione, navigatio-ne, alvi leni purgatione, caloris exter-ni et causarum remotarum evitacione, aequanimitate, est praecavendus.

CAP. II. EPISTAXIS.

CHARACTER.

Capitis dolor vel gravitas, faciei rubor, narium pruritus, sanguinis profu-sio e naribus.

C U R A.

Quando non crisin indicat; est cohimbenda corporis, capitisque situ erecto, narium pressione, capitum immersione in aqua frigida muriate sodae in ea soluto; linctolis polline vel sulphate aluminae sparsis et in nares ingestis: irritationis omnis evitacione; redditui ejus occurritur fontanellis et modis modo memoratis.

CAP. III. HÆMOPTYSIS.

CHARACTER.

Genarum rubor; molestiae aut doloris, et aliquando caloris in pectore, praecipue sub sterno sensus; in ore salis sapor; dyspnoea; faucium titillatio, nonnunquam nausea et vomitus; tussis aut tussicula sanguinem floridum, sacpe spumosum rejiciens.

CAUSÆ.

Causae predisponentes sunt , certa ætas , nempe inter decimum sextum et trigesimum quintum annum ; temperamentum sanguineum ; sensibilitas nūnia ; excretionum consuetarum suppressio ; haemorrhagiae priores ; labes haereditaria , quae , collo longo , procera statuра , thorace plano et angusto , scapulis depresso , notatur et omnes causae remotae haemorrhagiae .

DIAGNOSIS.

Sanguinis profluvium ab faucibus tussi nulla comitatur : haematemesis , vomitu sanguinir nigri , alimentis commisti , dignoscetur , tussi nulla comitante.

PROGNOSIS.

Prognosis magis fausta , si haemoptysi cessante , nullus thoracis dolor , dy-

sponea vel tussis permaneat: vel si, ab evacuatione suppressa vel vi externa sine causis praedisponentibus oriatur.

CURA.

Regimen antiphlogisticum sedulò est usurpaudum; venaesectio secundum symptomatum violentiam repetita; cathartica refrigerantia; epispastica; vomitoria lenia; coquere muriatis sodae, astrigentia; corporis mentisque quies et alia pro haemorrhagiis modo memorata: an postea, cinchona, acidum sulphoricum et opium? an corporis, usque ad pubes aqua frigida, immersio?

CAP. IV. PHTHISIS.

SYMPTOMATA.

Plura vel pauciora signa modo memoranda phthisin saepe antecedunt; pyrexia lenis exercitatione minima aucta; manuum volae ardentes et madoris ex-

pertes presertim die advesperascente :
 oculi post somnum humidi; urina aucta;
 cutis arida pedum praecipue aurora ad-
 ventante ; genarum erubescencia ; rau-
 cedo ; dolor pectoris levis vel acutus ;
 dolor lateris fixus vel dolor lateris utri-
 usque lancinans ; cephalalgia ; animi de-
 liquia crebra ; appetitus defectus ; exer-
 citationi vel motui inaptitudo universa;
 tunc symptomata morbum certum no-
 tantia superveniunt , nempe , tussis sicca
 plus minusve violenta levissimis cau-
 sis exacerbata ; raucedo ; praecordiorum
 gravitas et constrictionis sensus praeser-
 tim post motum , in unum magis quam
 in alterum latus decumbendi difficultas
 et respiratio leviter molesta ; pulsus ab
 initio frequens , plenus atque durus ; re-
 spiratio multo citatior quam in salute
 evadit costis elevatis et sono suspiratio-
 nem referente perficitur ; tussis vespere
 adventante sensim ingravescit , per no-
 ctem aegrè vexat , et muci posteaque
 puris expectoratio accedit ; haec signa ,
 lateris et thoracis doloribus erraticis ,

lassitudine et animi asperitate stipantur; cibi appetitus imminuitur, et vomitus saepe post pastum obvenit: Jamque tanscens corpus, sputa copiosiora, purulenta, colore variantia, albentia, flaventia, viridentia nonnumquam sanguine striata cum sapore quasi materiae putrescentis, rejiciuntur, et hec tanta juxta supervenit, cujus exacerbationes, bis intra viginti quatuor horas, una obscurior meridie circiter, altera sub noctem, praeeunte plenaria languoris, frigorisque sensu, accenduntur hae accessiones, per aliquot horas, calore et siti auctis, tussi magis molesta et sputo minus libero, persistant, manè, sudores plus minusve profisi corpus magnopere infirmantes, erumpunt; urina sedimentum leve surfuraceum deponit, et omnia signa aliquid levaminis recipiunt, cutem sollempmodo arida manente: lingua, faucesque quasi leviter inflammatae rubent aut aphthis obducuntur; pallor cadaverosus totum vultum praeter exiguum circumscriptum genarum spatium occupat;

pat ; mōrbo procedente tunica adnata
margaritarum colorem refert ; diarrhoea
colliquans cum sudoribus vices alternans,
pēdes oedematosi , capilli incidentes ,
ungues adunci , elata praecordia sum-
mam virium defectionem demonstrant ,
et mors amica scenam claudit .

CAUSES.

Causae praedisponentes sunt , labes
haereditaria ; conformatio thoracis prava ;
cervix longa ; humeri elati ; thorax an-
gustus ; temperamentum sanguineum ;
scrofula ; sensibilitas nimia ; rubeola ;
eruptiones retropulsae ; evacuationes im-
modicae ; nimia sanguinis oxygenatio ;
extranea in pulmones accepta : Causae
occasionales sunt , haemoptysis , catar-
rhus , asthma , pneumonia , tuberculæ ,
contagium.

PROGNOSIS.

In phthisi incipiente anceps est pro-
gnosis ; ex febris hecticae violentia , de-

bilitate , sputi natura , aliisque signis plus minusve violentis , eventus judicium est trahendum.

C U R A.

Sanguinis missio secundum aegri vires in primo stadio ; diaeta ex lacte vel vegetabilibus confecta ; emetica ex ipecacuanha et sulphate zinci in omni morbi stadio ; regimen antiphlogisticum ; epispastica ; setacea ; nitras potassae in dosi decem vel quindecim granorum ; ambulatio in aëre frigido et sicco : in studio secundo diaeta cardiaca foret et stimulans , praecipue ex lichene islandico , piscibus testaceis et similibus : digitalis ; exercitatio ; praecipue navigatio , equitatio ; climatis mutatio ; locorum arctorum evitatio , etc. aetheris sulphurici et conii maculata vaporis inhalatio ; aera arte facta : in studio tertio balsama naturalia , acida mineralia , aqua super-carbonatis patassae vel sodae , opiate , et alia supra recensita : an cinchona ? an solutio mu-

riatis calcis? an digitalis et hydrargyri
praeparationes in dosi adeo ad modum
refracta , ut primo arteriarum pulsus ci-
tati minuantur , et postea systema hydrar-
gyro leniter affectum reddatur ?

CAP. V. HÆMORRHOIS.

SYMPTOMATA.

Capitis gravitas vel dolor , vertigo ,
nausea , lumborum anique dolor ; circa
anum tubercula livida dolentia , e qui-
bus plerumque profluit sanguis , qui ,
aliquando etiam , nullo tumore apparen-
te , ex ano stillat , alvus plerumque astri-
cta ; pyrexia .

C A U S A E .

Ætas provecta ; plethora ; alvi duri-
ties ; cibus et potus immodice sumpti ;
arthritis ; obstructio hepatica ; prolapsus
ani ; usus purgantium immodicus ; quae-
cunque redditum sanguinis venosi impe-

diunt ; recti relaxatio et ejus venarum torpor.

C U R A.

Si dolor sit immanis et partes multum tumefactae , hirudines parti affectae sunt admovendae , et fomenta sunt utenda ; alvus astricta laxantibus est amovenda , quorum optima sunt sulphur sublimatum , oleum de seminibus ricini , super-tartris potassae , copaiferae officinalis resina liquida , electuarium cassiae sennae , et similia : astringentia externa , qualia quercus cerris , cortex quercus , frigida lavatio : astringentia interna : si ab ani prolapsu ortum traheret , rectum quam primum in suum locum arte est restituendum , et redditui ejus occurrentum remediis causae ejus idoneis : plethora modis sub haemorrhagia memoratis est amovenda , et causae remotae sunt evitandae .

CAP. VI. MENORRHAGIA.

SYMPTOMATA:

Dorsi, lumborum, ventris, parturientium instar, dolores; menstruorum copiosior vel sanguinis ex vagina praeter ordinem fluxus, pyrexia, dyspnoea, capitisque dolore, comitatus, sistema totum infirmans.

CAUSA.

Plethora, liquores spirituosi, vixtus lautior; exercitium nimium; ictus abdomini inferiori illati, ejusve contusiones; misus violenti; animi pathemata violenta; systematis laxitas et debilitas; venus immodica; abortus cerebrior; partus difficilis; alvi durities; frigus pedibus admotum; thecae usus immoderatio: Causa proxima est, uteri vasorum auctio actio, eorum laxitas et ruptura.

PROGNOSIS.

Copia sanguinis larga subito effusa ;
sudores frigidi et convulsiones magnum
periculum imminent.

C U R A.

Symptomata adsint phlogistica , venae-
sectio ; regimen antiphlogisticum , prae-
cipue corporis mentisque quies , et ca-
loris evitatio ; diaeta parca ; laxantia le-
nissima ; enemata ; refrigerantia ; lectus
minus mollis foret et stragulis levioribus
opertus : astringentia interna , ut acetis
plumbi , sulphas aluminae , kino , mimo-
sa catechu , cinchona , infusum rosæ :
externa , ut linteal aqua gelida et acido
acetoso vel quercus decocto forti made-
facta , pudendis et dorsu applicanda : se-
dativa astringentibus conjunctis ; abdomi-
ni epispastica : In intervallis causac re-
motae sunt evitandæ , et tonica , qualia
cinchona ; ferri praeparationes , exerci-

tatio modica et balneum frigidum sunt
utenda .

CAP. VII. LEUCORRHOEA.

SYMPTOMATA.

Materiei colore varientis e vagina , si-
ne uteri topica affectione fluxus , coxis
et dorso dolore continuo stipatus , me-
norrhagia conjunctus vel mox secutus ,
systema totum , præsertim ventriculi
functiones debilitans ; pyrexia , dyspnoea ,
et palpebrarum tumore nonnunquam con-
comitantibus .

C A U S E .

Causæ sunt partus frequens sine in-
fantis lactatione ; partus difficiles ; me-
norrhagia , et omnes causæ eam pro-
ducentes .

CURA.

Astringentia , qualia haematoxylum campechianum et alia supra recensita ; injectiones astringentes in vaginam immisae ; stimulantia , ut meloe vesicatorius , oleum volatile pini purissimum , copaiferae officinalis resina liquida , etc. tonica , praecipue cinchona , ferri præparationes , sulphas zinci , et balneum frigidum ; rhei palmati pauca grana cum opii grano uno omni nocte per plurē menses ; emplastrum picis burgundicæ compositum lumbis admotum foret , et indusium laneum induere convenit.

CAP. VIII. AMENORRHœA .**SYMPTOMATA .**

Dyspepsia ; cibi desiderium aut imminuitur vel absurdum est ; cutis pallor vel decoloratio ; oculi subsedissae videntur et circulo livente circumdantur ; la-

bia rubedinem amabilem perdunt ; venae minus plenac apparent ; corporis tumor mollis ; asthenia ; respiratio citata praecipue post motum ; lumborum , coxarum , nonnumquam etiam capitis dolor ; palpitatio ; syncope ; menstruorum : retentio : Chlorosis auctorum .

CAUSÆ.

Uteri vasorum actio infirmata ab systematis debilitate et laxitate orta .

CURÆ.

Systematis tonus est restaurandus exercitatione omnigena ; balneo frigido ; tonicis , praecipue ferri preparationibus , myrrha , carbonate potassae , et aromatibus conjunctis ; vasorum uteri excitanda est actio cathartica , nempe aloe perfoliata , sub-muriate hydrargyri et similibus ; ambulatione ; saltatione ; friktione ; pediluviiis ; somentis tepidis regionis hypogastricae ; ictu electrico ; arteriae

iliaceae compressione , et prae omnibus nuptiis : an gas oxygénium dilutum ? Rubia tinctorum parum mihi efficax esse videtur .

CAP. IX. SUPPRESSIO MENSIMUM.

SYMPTOMATA.

Dorsi , lumborumque dolor ; dyspepsiae et hysteriae symptomata ; alvus astricta ; dolores colici , haemorrhagiae ab variis corporis partibus .

CAUSE.

Uteri vasorum extremorum spasmus sive rigiditas nimia ; atonia atque debilitas corporis universi .

CURA.

Si adsit plethora , venaesectio , aliter non ; uteri vasorum constrictio est amovenda balneo tepido ; fomentis regioni

pubis admotis ; catharticis , opiatis , antispasmodicis ; his nihil valentibus , medicamenta et alia , ad speciem priorem aptata , sunt adhibenda : remedia haecce plus auxiliū adportabunt , si eo tempore quo n̄sus haemorragicus impendet utantur : Ad dysmenorragiam opiate , pediluvia , balneum tepidum et diluentia tēpida conducunt .

CAP. X. HÆMATEMESIS .

CHARACTER.

Sanguinis coloris nigri , grumosi , alimentis commisti ex ventriculo vomitu rejectio ; nausea ; doloris et gravitatis sensu praecedente :

CAUSE.

Plethora ; evacuationes sanguinis suppressae ; tumores splenem vel hepar comprimentes ; vis externa .

CURA.

Hic morbus plerumque symptomaticus est ; si haemorrhagia sit violenta, et plethora adsit , venaesectio et alia haemorrhagiis idonea sunt usurpanda : in genere astringentia et tonica , qualia cinchona , ferri praeparationes et opium , conducunt : si ab evacuationibus suppressis oriatur , liae sunt restaurandae : si ab tumoribus splenem vel hepar comprimentibus , hydrargyrus , etc. conium maculatum .

CAP. XI. HÆMATUARIA .

CHARACTER.

Plerumque morbus est symptomaticus, a calculo renem lacerante , haemorrhoidibus suppressis , vel sanguine in putredinem vergente , oriens .

CURĀ.

Si ab calculo oriatur, enemata laxantia; regimen antiphlogisticum; demulcentia, et aqua super-carbonatis potassae vel sodae sunt utenda: si ab haemorrhoidum suppressione, remedia ei aptata sunt utenda: si ab putredine, antisепtica. Linteum in aegri urina immersum colore rubro tingetur.

ORDO V. PROFLUVIA.

CHARACTER.

Pyrexia cum excretione aucta, naturaliter non sanguinea.

CAP. I. CATARRHUS.

SYMPTOMATA.

Pyrexias saepē contagiosa; capitis gravitas vel dolor; nares farctae aeris adi-

tum impedientes ; muci ex glandulis membranae narium , faucium , vel bronchiarum excretio aucta ; nonnunquam sternutatio et oculorum quasi distentio : lachrymarum fluxus ; faucium rubedo , calor atque tumor ; tracheae asperitas ; raucedo ; angustiae in thorace sensus ; dyspnoea ; tussis molesta primo sicca postea mucum copiose ejiciens .

CAUSE :

Causae remotae sunt frigus corpori admotum , et nonnunquam contagium : Causa proxima est , humorum ad glandulas mucosas narium , faucium , et bronchiarum affluxus auctus , statu inflammatorio stipatus .

PROGNOSIS.

Catarrhus maxima ex parte periculi expers , sed in senibus peripneumoniam notham nonnunquam inducit et in praedispositis phthisia creare videtur .

C U R A.

Vix aliud plerumque requiritur , nisi , ab cibo animali abstinentia , diluentia blanda , tepida ; sin urgeat diathesis phlogistica , sanguinis missio , regimen antiphlogisticum , laxantia , demulcentia , diaphoretica ut pulvis ipecacuanhae et opii vel tartris antimonii ad nauseam sollempmodo movendum , expectorantia mitra et epispastica , utenda sint : diathesi phlogistica imminuta , opiata ; oleum naso externo est admotu .

CAP. II. DYSENTERIA .

SYMPTOMATA .

Pyrexia contagiosa , nausea , vomitus , intestinorum inflatio , tormina gravia , dejectiones parcae , frequentes , mucosae , spumosae , sebaceae vel sanguinolentae et fimbriis membranacea admixtae , retentis plerumque faecibus alvinis , vel

massulis stercoris indurati (scybala appellatis) solummodo comparentibus , tenesmus , nonnunquam singultus .

C A U S A.

Causa remota specificum est contagium et causa proxima esse videtur coli constrictio spasmodica .

P R O G N O S I S:

Tenesmus et tormina valde vehementes ; dolor subito cessans cum pulsu debili et intermittente ; faeces valde foetidae ; magna debilitas ; petechiae , singultus , infausta sunt signa ; diaphoresis lenis ; dejectiones minus frequentes , et vires parum fractae , fausta sunt signa .

C U R A.

Venaesectio si urgeat diathesis phlogistica ; emetica , et magis poterint si non tantum vomitum sed alvum quoque

moverint; cathartica repetita, praesertim sulphas sodae, oleum e seminibus ricini, phosphas sodae, etc. et omni nocte post catharticorum usum opiate et p[re]ae omnibus pulvis ipecacuanhae et opii, enemata larga ex amylo vel lini seminibus parata; demulcentia mucilaginosa; fomenta; semicupium.; epispistica; diaeta ex lacte et oryza: quando amoveatur diathesis phlogistica, tonus intestinalis tetricis et astringentibus, ut cinchona; quassia simaruba, quassia, floribus anthemis nobilis, colomba, gentiana lutea et similibus, est restaurandus: an, morbo inveterato, sub-murias hydrargyri ad salivationem lenem ciendum? an extractum nucis vomicæ in dosi grani et dimidii tertiiis horis? Si sub intermittentis typo compareat febris, cinchona est administranda.

NEUROSES.

CLASSIS II. NEUROSES.

CHARACTER.

Sensus et motus laesi sine pyrexia idiopathica, et sine morbo locali.

ORDO I. COMATA.

CHARACTER.

Motus voluntarii cum sopore sive sensuum feriatione.

CAP. I. APOPLEXIA.

CHARACTER.

Motus voluntarii fere omnes immuniti, cum sopore plus minusye profundo, stertore, faciei tumore et rubo-

re , superstite motu cordis et arteriarum; praecedentibus nonnumquam vertigine , capitis dolore , epistaxi , aurium tinnitus , incubo , caligine , vel stupore..

CAUSE..

Causae prædisponentes sunt aetas senilis ; caput magnum , cervix brevis ; obesitas immodica ; vita sedentaria ignava ; vinum aliquique liquores spirituosi nimis liberaliter adhibiti ; evacuationes solitae suppressae ; studium nimium ; Causae occasioales sunt , exercitatio vehemens ; pathemata anni violenta ; calor extermus ; compressio colli externa ; vis externa ; inspiratio plena et longa ; nimia vasorum cerebri distentio et eorum laceratio.

DIAGNOSIS:

Ab paralysi , stertore , somno profundo et motuum omnia voluntariorum immobilitate dijudicabitur apoplexia.

PROGNOSIS.

Prognosis fausta vel iufausta pro accessionis gravitate dirigenda erit, non nunquam fauste solvitur morbus haemorrhagia vel diarrhoea.

CURA.

Sanguinis missio generalis nimis libera plerumque nocet, sed cucurbitulae cruentae occipiti admotae maxime conducunt, capitis fomenta, ictus electrici lenes per cranium missi; cathartica acria ex cucumere colycinthide, aloe perfoliata, extracto convolvuli jalapae et similibus parata; enemata acria; vesicatoria capiti, spinae dorsi et extremis cataplasmata sinapeos; regimen antiphlogisticum; capitis positura erecta: Ad redditum ejus praecavendum, causae excitantes sunt evitandae et diaeta minus foret nutriendis; liquoribus spirituosis abstinentia; exercitatio modica; medica-

menta leniter alvum subducentia ; setacea vel fontanellae prope caput maxime conducunt ; an errhīna ? an opium ? an hydrargyri præparations ad salivationem lenem ciendum ?

CAP. II. PARALYSIS.

SYMTOMATA.

Motus voluntarii nonnulli tantum imminuti , saepe cum sopore ; pulsus tardus et mollis ; alterutro corporis latere plerumque affecto , inde hemiplegia appellato ; præeuntibus saepissime torpore universali , vertigine , capitis gravedine , mentis hebetudine , oblivione insueta , algoris sensu lateris vel partis passuræ , et nonnunquam tremore et dolore.

CAUSÆ.

Cerebri compressio ab effusionibus sanguineis , serosis vel tumoribus ; vis nervæ imminuta ; venena in corpus ac-

cepta ; colica pictonum ; apoplexia et
actas provecta.

DIAGNOSIS.

Ab apoplexia , aliisque morbis pulsus
et symptomatibus facile diagnoscetur.

PROGNOSIS.

Partis laborantis calor , dolor levis
punctarius seu formicationis sensus ;
pyrexia vel diarrhoea, faustae sunt notao.

CURA.

Si ab cerebri compressione oriatur ,
venae sectio et alia **remedia** apoplexiae
aptata sunt utenda ; quando hemiplegia
solummodo manet , utenda sunt stimula-
lantia externa , ut , epispastica , rubefac-
cientia , e. g. tinctura meloes , vesicato-
rii , linimentum ammoniae , aether sul-
phuricus etc. frictio ; urticatio ; electri-
citas et balneum frigidum : stimulantia

interna, ut, anthemis pyretrum, sinapis alba, cochlearia armoracia, arnica montana, sales volatiles et hyflargyrus; diacta nutriens foret et stimulans; postea aquae Bathonienses.

ORDO II. ADYNA MIÆ.

CHARACTER.

Motus involuntarii, sive vitales, sive naturales imminuti.

CAP. I. SYNCOPÆ.

SYMPTOMATA.

Motus cordis imminulus vel aliquan-
diu quiescens, sine causa manifesta sae-
pe rediens, cum cordis palpitatione ve-
hementi in intervallis, ex vitio cordis
vel vasorum vicinorum, vel ex systema-
tis totius affectione, oriens, nonnun-
quam vomitu, convulsionibus vel epi-
lepsia terminatus.

CAUSA.

Causa proxima esse videtur motus imminutus , vel cordis et arteriarum actio quiescens .

CURA.

Stimulantia in paroxysmo ad nares sunt applicanda ; postea tonica : si ab causa manifesta oriatur , remedia ei idonea sunt administranda .

CAP. II. DYSPEPSIA.***CHARACTER.***

Anorexia , nausea , vomitus , ventriculi inflatio , ructus acidi , ruminatio , cardialgia , gastrodynia , anxietas , languor ; animus leniter depresso , pauciora saltem vel plura horum simul concurrentia , plerumque cum alvo astricta , et sine alio vel ventriculi ipsius , vel aliarum partium morbo .

CAUSES.

Causae remotae sunt duplices, 1. quae in ventriculum ipsum protinus agunt: 2. quae in alias corporis partes agunt et dein in ventriculum atoniam diffundunt. Hae sunt speciei prioris, sedantia seu narcotica, qualia, opium, liquores spirituosi; nicotiana; thea et coffea; acida; aromata; cibus plenior; vomitio nimis crebra; amara; liquores calidi nimis profuse hausti; salivae excretio nimia. Quae in alias corporis partes primum agunt, ut, affectus animi violenti, vita sedentaria, studium intensius, venus nimia, tempestas humida et frigida sine exercitatione; inebrietas: Causa proxima est atonia fibrarum ventriculi muscularium et debilitas.

CURE.

Emetica; sales alkalini et absorbentia; praecipue aqua calcis, sapo: cathartica

ex aloë perfoliata , rheo palmato vel cassia sennae aromatibus vel amaris conjunctis ; episistica dorso ; postea ad tonum ventriculi restaurandum , tonica , qualia ferri praeparationes , quassia , cinchona , colomba et gentiana ; quaedam symptomata sunt levanda , ventriculi inflatio levatur aethere sulphurico : cardialgia acido sulphurico , sapone , aqua seltzerana vel opio est amovenda : vomitus clysteribus opiatis : anxietas et oppressio post pastum aromatibus ut decem piperis nigri granis statim sumptis : diaeta ex cibo animali foret confecta ; exercitatio modica et balneum frigidum medelam accelerant : aquae bathonicae et aqua ex pino sylvestri parata conducent : causae occasionales sunt evitandae .

CAP. III. HYPOCHONDRIASIS.

CHARACTER.

Dyspepsia cum languore , moestitia , metu praecipue mortis , morositate , zelotypia , pravisque suspicionibus omnigenis , ex causis non aequis in temperamento melancholico , alvo modo dura modo fusa .

DIAGNOSIS.

Hypocondriasis ab dyspepsia dignoscitur , languore , mortis metu , pravisque suspicionibus semper praesentibus et signis dyspepsiae minus violentis vel omnino absentibus ; in dyspepsia , signa ejus affectionis majori semper adsunt gradu , et alia supra memorata minus sunt violenta vel omnino absentia ; hypochondriasis nunquam in prima aetate occurrit , circiter vero , vel post annum trigeminum quintum plerumque ingruit .

CURA.

Vesicatorium regioni epigastricae vel emplaſtrum picis burgundicae · compositum abdomini est admotu ; aquae batheonicae ; balneum tepidum : sed in hac affectione animi alacritas est sustentanda , consortia venustorum atque lepidorum , exercitatione praecipue equitacione , venatione , aucupatione , perpetua demigratione , navigatione , oblectamenti omnigenis et anxietatis impeditio- ne ; symptomata dyspepsiae ab modis modo memoratis sunt levanda : pulveris rhei phalmati grana sex et opii granum unum omni nocte , interdiu medicamenta simplicissima sunt utenda .

ORDO III..SPASMI .

CHARACTER.

Musculorum vel fibrarum musculorum motus abnormes .

CAP. I. TETANUS (Trismus).

SYMPTOMATA.

Maxillae inferioris praecipue , acuta , dolorifica et spastica rigiditas ; deglutiendo difficultas , dolor maxime acutus sub cartilagine ensiformi , hinc ad spinam dorsi et illinc ad cervicem et scapulas , jaculans , spasmos ingravescens : quando corpus in posteriora curvatur , opisthotonus appellatur , quando ad anteriora , emprosthotonus .

CAUSÆ .

Causæ sunt frigus et humiditas corpori calefacto admotæ ; puncturae ; lacerationes vel laesiones nervorum vel tendinum ; operationes variae chirurgicae .

PROGNOSIS.

Spasmi violenti et admodum crebri maximum periculum portendunt, morbus sine crisi sensim in salutem terminatur.

C U R A.

Vinum et opium libere; cinchona; unguento hydrargyri vel aetheris sulphurici et tincturae opii partibus aequis frictio; electricitas; sed praे omnibus balneum frigidum in convulsionis paroxysmo; in trismo nascentium, qui infantes intra duas primas ad nativitatem septimanas adoritur, meconium primo est purgandum, tunc oleum succini purissimum moschus, vinum et balneum frigidum utenda sunt.

CAP. II. CHOREA.

CHARACTER.

Inpuberes utriusque sexus, ut plurimum intra decimum et decimum quartum aetatis annum adorientes, motus convulsivi ex parte voluntarii, plerumque alterutrius lateris, in brachiorum et manuum moto, histionum gesticulationis referentes; in gressu, pedem alterum saepius trahentes quam attollentes.

CURE.

Systematis mobilitas et debilitas.

CURA.

Tonica, qualia cinchona, ferri, cupri et zinci praeparationes; balneum frigidum; electricitas; cucurbitulae sine ferro: auli spasmatica, ut atropa bella-

donna, opium, hydrargyrus, succus hyoscyami spissatus, etc. an carbonas potassae?

CAP. III. EPILEPSIA.

SYMPTOMATA.

Repente plerumque accedit et non-nunquam aegrum dormientem invadit quanquam saepenumero ante paroxysmum, languorem universum, lassitudinem, capitis dolorem et vertiginem, persentiscit aeger; incipit dein haud raro paroxysmus sensu frigoris, quasi aura frigida caput versus ascidente, quod quamprimum attigerit, aegrotus, si tunc temporis steterit, concidit, clamorem horrendum edens; sensus omnigeni expers jacet; muscularis corporis totius, potissimum vero faciei, digitorumque violentissime convelluntur; os, oculique distorquentur, materies spumosa ex ore ejicitur; pulsus ab paroxysmi initio celer, exilis vixque percipiendus est, ad

ejus finem , plenior ; tardior , debilis tam
en evadit ; his signis sensim deceden-
tibus , paroxysmos , aegro in soporem
illabente , finitur , brevi deinde ad sese re-
dit , nihil omninoquod per paroxysmum
acciderat , reminiscens ; in apoplexia fre-
quenter finitur .

CAUSÆ.

Causæ predisponentes sunt quedam
systematis nervosi mobilitas et labes haer-
editaria : Causæ excitantes sunt stimuli
mechanici ; stimuli chemici acres ; irri-
tationes mentales praecipue gaudium ,
ira ; irritatio a vasis sauguiferis intra
cranium distensis oriunda ; vermes ; den-
titio ; variolæ accedente papularum erup-
tione ; quicquid tensionem vasorum ce-
rebrei imminuit , haemorrhagiae profusae ,
terror , horror , odores complures ; ve-
nena ; aura epileptica .

DIAGNOSIS.

Ab convulsione omnigena, sopore et impressionum: externarum: sensu omnino sublatis: dignoscetur: ab apoplexia, motibus voluntarii: auctis: ab hysteria, globo ad fauces: ascendentem, caeterisque signis paroxysmum: praecedentibus absens-tibus.

PROGNOSIS.

In epilepsia: symptomatica magis fausta, quam in idiopathica; in junioribus minus periculosa, quoniam in pueris sub pubertatis tempus, et in puellis mensibus provenientibus decedere plerumque solet; febris: intermittens vel eruptio cutanea: saepe morbum fauste solvit.

CURA.

Si sit morbus: symptomaticus: primo detegendus est, atque remedia ei ido-

nea sunt usurpanda; cum adsit plethora, modis jampridem recensisit, fontanellis et setaceis est amovenda; in paroxysmo, antispasmodica, et stimulantia interna et externa sunt uti: in intervallis tonica, ut cinchona, cupri, zinci et ferri praeparationes; nitras argenti; oxidum arsenici; balneum frigidum et exercitatio: antispasmodica, e.g. oleum animale, oleum succinni rect.: hydrargyrus, aether sulphuricus, monschus, datura stramonium, digitalis; sed eorum potissimum est opium, quod dari deget per plures menses saepe indies: si omnibus frustra tentatis, diaeta, ratio vitae et regio prorsus sunt immutandae.

CAP. IV. PALPITATIO.

CHARACTER.

Motus cordis vehemens, abnormis.

CAUSÆ.

Cordis vel vasorum vicinorum vitium,
plethora , debilitas vel systematis mobi-
litas .

C U R A.

Hujus affectionis medela ab causis ex-
citantibus quae evitari debent est peten-
da ; si ab plethora vel debilitate oria-
tur , remedia iis aptata uti sunt .

CAP. V. ASTHMA .***SYMPTOMATA.***

Adveniente hora prima vel secunda
matutina incipit paroxysmus cum angu-
stiae in pectore sensu , spiritus aegre
trahitur cum sibilo glottidis strepente , e-
lecto surgere , ad erectam corporis po-
situram confugere , cogitua : majore ae-
ris quantitate eget , vox imbecillis effici-

tur et loquelae exercitium magis minus
ve injucundum est , sudor frigidus cir-
ca faciem et pectus erumpit , tussis quae
sub paroxysmi initio difficilis erat vel
nulla , aurora appropinquante , libera ,
cum sputo muci saepe copioso evadit ,
tunc sublevantur symptomata , sed per
aliquot dies seu potius noctes die ad-
vesperascente exacerbantur , postea pro
tempore cessant omnino ; pulsus ple-
rumque celer , debilis , parvus , et ur-
na antea pallida sedimentum deponit ;
saepe paroxysmum praecedunt lassitudo ,
torpor , somnolentia , ventriculi inflatio ,
ructus crebri , gravitas atque capitis
dolor .

CAUSE.

Atmosphera humida , frigida , nebu-
losa ; rapentinac tempestatis vicissitudi-
nes ; podagra retrocedens ; febres prae-
cipue intermittentes ; evacuationes soli-
tae repente repressae ; labes haereditaria .
Causa proxima pendere videtur a spas-

modica fibrarum muscularium bronchio-
rum constrictione .

DIAGNOSIS.

Ab signis supra recensitis cognoscetur
asthma .

PROGNOSIS.

Ætas juvenilis medici conatibus plu-
rimum favet ; saepe phthisi vel hydro-
thorace terminatur ; respiratio abbrevia-
ta et brachiorum paralysis infausta sunt
omnia .

CURA.

In paroxysmo , sanguinis missio , ni-
adsit diathesis phlogistica , plerumque
nocet ; emetica lenia multum prosunt ,
nec non vesicatoria repetita pectori im-
posita ; clysteres lenes ; balneum tepi-
dum ; antispasmodica , presertim opium,
aether sulphuricus et ferula assae foeti-

dae : expectorantia , ut , scilla , tartris antimonii , physeteris macrocephali materia in crano reperta , etc. Reditui obviam itur , loci vel climatis mutatione , cibo nutriente , blando et ab omni frumentaria immuni ; exercitatione ; causarum excitantium evitacione ; fontanellis ; tonicis , e. g. cinchona , ferri praeparationibus : an digitalis ?

CAP. VI. PERTUSSIS.

SYMPTOMATA.

Morbus contagious ; tussis convulsiva , strangulans cum inspiratione sonora , (vulgari nomine the Kink insignita) iterata , paroxysmo , muci quantitate c pulmonibus , faucibus et naribus , rejecta , finito , et per intervalla admodum variantia , iterum renovato , pyrexia nonnumquam comitante .

CAUSA.

Contagium .

PROGNOSIS.

Infantibus duobus annis minoribus gravior est morbus ; respiratio valde difficultis ; pyrexia acuta praecipue si signis pneumoniae fuerit conjuncta , infaustae sunt notae : expectoratio modica ; cibi appetentia nunquam prostrata sed post vomitum renovata , et epistaxis mitis fausta sunt omina .

CURA.

Sanguinis missio aut generalis aut localis si dyspnoea vel pyrexia urgeat : emetica , ad plenam vomitionem , nau-seamque ciendum: vesicatoria thoraci admota ; balneum tepidum ; vapores aquae ferventis in pulmones accepti ; antispasmodica , ut opium , castoreum , moschus ,

ferula assae: foetidae , oleum succini ;
sed prae omnibus tinctura meloes vesicatorii ad lenem dysuriam inducendum : tonica ut cinchona , oxidum zinci : solutio oxidi arsenici , fowleriana ; tinctura digitalis ; aeris mutatio : durante morbo alvus leniter soluta foret redditia .

CAP. VII. PYROSIS.

CHARACTER.

Epigastriū dolor urens et constrictio-
nis sensus positura erecta auctus, vacuo
plerumque ventriculo accedens , cum co-
pia humoris aquēi, plerumque insipidi,
aliuando acris eructata .

CAUSE.

Frigus extremis admotum et animi
pathemata violenta .

CURA.

In paroxysmo opium, aether sulphuricus, aliaque antispasmodica sunt administranda, postea nux vomica.

CAP. VIII. COLICA.**SYMPTOMATA.**

Dolor abdominis, praecipue circa umbilicum torquens, ejus retractio versus spinam; muscularum abdominis spasmi, plurima quasi tubercula ad tactum sacci pomis referti instar, efficientes; vomitus; alvus astricta; pyrexia nulla: quando peristalticus intestinorum motus invertitur, Ileus appellatur.

CAUSES.

Causae remotae sunt frigus, facies induratae; bilis acris; concretiones calcareae; venena in corpus recepta, praec-

cipue plumbum ; flatus . Causa proxima esse videtur spastica alicujus intestinorum partis contractio .

DIAGNOSIS.

Ab enteritide dignoscitur dolore torquente , umbilici retractione , pulsu , pyrexiae absentia et dolore pressu immunito : ab hepatitis et nephritide signis aliubi recensisitis et pyrexia absente .

PROGNOSIS.

Dolor migrans sensimque cessans , et alvus catharticis respondens fausta sunt signa : dolor fixus , violentus , vel co subito cessante , alvus pertinaciter astricta , singultus , delirium , infäustae sunt notae .

CURA.

Venaesectio , si adsit diathesis phlogistica secundum pulsus statum et aegri

vires , repetita , ni adsit magna debilitas ; antispasmodica , ut opium , hyo scyamus , semicupium , abdominalis fomenta vel vesicae aqua calida refertae abdomini admotae , epispastica : cathartica lenia , ut sulphur potassae vel sodae , supertartris potassae , infusum cassiae sennae , oleum ricini , et iis nihil valentibus , convolvulus jalapa , sub-murias hydrargyri vel cucumis colocynthis; enemata primo lenia , postea ex pini laricis resina liquida , fumis vel infuso nicotianae parata , his omnibus incassum tentatis , aqua frigida nudis femoribus et cruribus est affundenda , vel hydrargyrus ore est datu , vel aqua calida manu larga in anum est immittenda : si ab flatu oriatur antispasmodica .

Colica Pictonum cognoscitur praeeunte ponderis vel molestiae in abdominaline , praecipue circa umbilicum , sensu ; acedente dolore colico , primum levi , non continuo , et praecipue post pastum aucto , tandem graviori et fere perpetuo ,

cum dolore brachiorum et dorsi in paralysin demum abeunte : Curatur haec affectio hydrargyri praeparationibus tali quantitate datis opio conjuncto ad lenem salivationem ciendum ; catharticis lenibus modo memoratis ; balneo tepido et aliis supra recensisitis : venaesectio summo periculo stipatur : ad paralysin aquae Bathonicae .

CAP. IX. CHOLERA .

SYMPTOMATA .

Humoris biliosi vomitus , ejusdem simul dejectio frequens , anxietas , tormenta , magna virium prostratio ; pulsus celer , exilis , frequens ; surarum spasmata , mense Augusti plerumque gransas ; intra viginti quatuor horas saepe jugulat .

CAUSE.

Causae remotae sunt aestas calida ;

acria ingesta ; crapula ; fructus immaturus nimis libere sumptus ; miasmata ex paludibus orta ; bilis acris . Causa proxima est duodenii intestini constrictio spastica .

PROGNOSIS.

Somnus vomitu cessante accedens aut morbus ad diem septimum excurrens , fausta sunt indicia ; rejecta admodum nigra ; sitis , calorque vehementes , pulsus valde debilis et intermittens , singultus , syncope , convulsiones , infausta sunt signa .

CURA.

Diluentia ex aqua tepida vel jusculo pullino libere sunt adhibenda et in alvum immittenda ; postea antispasmodica praecipue opium interne et in clysteribus ; si surarum spasmoda urgeant enemata anodyna et surarum cum camphora oleo soluta frictio ; morbo profligato tonica ; antispasmodica ; nutrientia .

CAP. X. DIARRHOEA.

CHARACTER.

Dejectio frequens faecum naturalium, muci, humoris lactei vel ingestorum parum mutatorum cum torminibus, nausea et vomitu; morbus non contagiosus, pyrexia nulla primaria et sine tenesmo.

CAUSE.

Causae remotae sunt, frigus pedibus applicatum; vasorum intestinorum absorbentium actio imminuta; crapula; acria ingesta; perspiratio subito repressa; effluvia putrida; fruges nimis libere sumptae; intestinorum tunicarum inflammatio erythematica; vermes; arthritis retrocedens et rheumatismus. Causa proxima est intestinorum motus peristalticus auctus.

DIAGNOSIS.

Diarrhoea , ab omni alio morbo signis jam nunc descriptis facile cognoscetur .

CURA.

Emetica repetita et postea dosi refracta , ad nauseam movendam ; diluentia, demulcentia , qualia thea ex seminibus lini parata , decoctum hordei , decoctum cordu cervi , etc. opiate : astringentia ut kino , sulphur aluminae , mimosa catechu , extractum haematoxyli campechianii , et similia : tonica ut cinchona , angusturae cortex , cascarilla , etc. absorbentia : diaeta praecipue ex carne assa vel jusculis : diarrhoea , typhum gravirem et podagram retrocedentem comitans remediis idoneis aliubi recensitis est amovenda .

CAP. XI. DIABETES.

SYMPTOMATA.

Urinae copia magnopere aucta , pri-
mo insipida , postea saporis mellei et
coloris subviridis ingestorum pondus
aequans vel superans ; sitis perpetua ;
appetitius nonnumquam vorax ; muci-
expuitio perpetua , fauces aridae ; cutis
arida plerumque squamosa ; pedum et
talorum oedema ; cutis calor areps le-
vissimo sine sudore ; pyrexia hectica .

CAUSÆ.

Causæ sunt omnes systema infirman-
tes ; liquores spirituosi nimis libere sum-
ti ; frigus corpori admotum ; venus im-
modica ; diuretica nimis acria ; evacua-
tiones immodicæ ; morbi praegressi .
Causa proxima esse videtur , status ven-
triculi morbosus potestates naturales di-
gestionis et assimilationis impediens .

CURA.

Diaeta ex cibo animali pingui , vegetabilibus ex toto evitatis ; emetica : dia-phoretica praecipue pulvis ipecacuanhae et opii ; sales alkalini ; hydro-sulphuretum ammoniae ; episistica parva renum regioni ; hydrargyri praeparationes ; camphora ; astringentia ut quercus cerris pulvis cum aqua calcis ; sulphas aluminae : tonica ; corporis inunctio cum axungia ; indusium laneum induere convenit.

CAP. XII. HYSTERIA.**SYMPTOMATA.**

Ventris murmura et inflatio ; sensus globi in abdomine se volventis , ad ventriculum et fauces ascendentis , ibique strangulantis ; convulsiones , quibus aegrae pectus manu violenter plangunt ;

sopor; his aliquandiu manentibus, aegrae lachrymantes, ridentesque vicissim; flatus per ructum e ventriculo expulsus, suspiriis crebris ex imo pectore tractis, quasi e somno excitatae aegrotae sensum motumque recuperant; urinae limpidae copia profusa saepe praecedente; animo nec sponte vario et mutabili.

CAUSÆ.

Causae remotaæ sunt systematis nervosi mobilitas et plurimæ epilepsiam producentes. Causa proxima pendere videtur ex affectione uteri spasmodica.

DIAGNOSIS.

Ab epilepsia, urina limpidae copia profusa paroxysmum praecedente, mortis metu, et globo hysterico, dignoscetur.

CURA.

In paroxysmo obest yena esectio si morbus dia manserit; sed antispasmodica, qualia, opium, castoreum, camphora, assafoetida interne et per enemata sunt usurpanda; enema ex aqua gelida est immitti; stimulantia naribus sunt admovenda, ut spiritus ammoniae succinatus, etc.: Reditui ejus occurritur cinchona; ferrum praeparationibus; antispasmodicis; exercitatione et balneo frigido.

CAP. XIII. HYDROPHOBIA.

SYMPTOMATA.

Inceto post morsum plerumque die circa vulneris horas; rubor, calor, tensione dolens; eodemque tempore circa locum laborantem, dolores vagi atque spasmi sese ostendunt; lassitudine, languore, anxiate, suspiratione frequen-

CAUSA.

Causæ remotæ sunt systematis débilis liquorum spirituosorum ingurgitatione inducta: obstructiones in pulmonibus, corde et hepate; nimia fluidorum ingurgitatio; evacuationes immodiæ; haemorrhoidum fluxus obstructus; inflammatio interna; ductus thoracici, lymphaticorum, ureterum vel vesicae ruptura ascitem inducens: Causa proxima constat ex fluidorum effusione acuta absorptione imminuta vel ambobus.

PROGNOSIS.

Si nulla viscerum obstructorum sint signa; si urina non multum imminuantur; si sitis minus urgeat, viribus eodem tempore illibatis, faustum dare judicium licet.

CURA.

Aqua collecta puncturis parvis vel fontanellis est exhaurienda; fasciae extre-
mis sunt admovendae; crurum frictio
praecipue mane; emetica repetita; ca-
thartica, cujusmodi sunt, gambogia,
convolvulus jalapa, cucumis calocynthis;
submurias hydrargyri, bryonia, gratiola,
super-tartris potassae, ut succus spissa-
tus monardicae elaterii, sed super tar-
tris potassae primarium locum possident;
si ad quantitatem unciae omni vel alter-
no mane in aqua satis larga soluti den-
tur: diaphoretica, ut tartris antimonii
vel pulvis ipecacuanhae et opii: diure-
tica, ut colchicum, scilla, acetis potas-
sae, tinctura meleos vesicatorii, succus
cinarae spissatus, et digitalis: his omni-
bus frustra tentatis, salivatio lenis ope
hydrargyri est promovenda; tonus sy-
stematicus restituitur exercitatione et to-
nicis, ut cinchona, quassia ferri praepa-
rationibus et balneo frigido: si pulsus

plenus , durus et tensus evadat . venae-
sectio multum prodest.

CAP. IV. HYDROCEPHALUS .

SYMPTOMATA .

Inter morbi initia languet aeger ; nau-
sea saepe vomitu una vel altera vice quo-
tidie tentatur : capitis dolor regionem
superciliarem , verticem vel cervicem
lancinat , nonnunquam cum ventriculi
affectionibus alternat ; caput aliquando
ad unum magis quam alterum latus in-
clinatur , lumen oculi refugiunt , plorat
et vigilat plerumque miser ; si adsit som-
nus , dentibus nonnunquam frendet et
nasum digitis carpit , subito perterritus
e somno excitatur , alvus plerumque
astringitur , et pulsus ab morbis initio
frequentior quam in sanis invenitur : si-
gnis supra memoratis invalescentibus ,
strabismus aliquantulus accedit , pupilla
paululum dilatatur , vomitio increbescit ,
capitis dolor coûsque intenditur et spi-

randi difficultas urget , calor corporis ,
 capitis praecipue , augetur , febris nunc
 instat et sub vespere gravescit , vultus
 rubedine subinde obducitur ; arteriarum
 pulsus hucusque citatiores , jam tardio-
 res , inaequales et intermittentes evadunt ,
 dolor aliquantulum mitescere videtur ,
 et sopore vigiliam stadii prioris excipien-
 te in coma tandem incidit aeger , ma-
 nibus capiti saepe admotis ; strabismus
 augetur , pupillae magis dilatantur , et
 caecus denique sit omnino , in gesta non
 amplius vomitu rejiciuntur , alvus manet
 astricta , nonnumquam tamen hic tem-
 poris vermes inferius dejiciuntur : cum
 per dies quosdam sub hac forma perdu-
 raverit morbus , arteriarum pulsus denuo
 fiunt aequales , adeo autem debiles nec
 non frequentes ut vix numerari queant ;
 spiritus difficillimè et cum stertore fer-
 tur ; toto corpore , praecipue in artibus ,
 maculae rubrae sese ostendunt , et dirae
 tandem convulsiones miserum e vivis cri-
 piunt .

C A U S A.

Hydrocephali causa esse videtur cerebri alicujus partis inflammatio, effusio-
nem inducens.

DIAGNOSIS.

Cephalalgia cum vomitu; lucis impaientia, et morbo invalescente strabismus, pupillaeque dilatatae, hydrocephalum ab aliis morbis dignoscunt.

PROGNOSIS.

Stupor, oculorum caligo, pulsus debilis et frequens, infausta sunt signa.

C U R A.

Sanguinis missio generalis vel topica, repetita, praecipue in morbi primo studio; cathartica cum sub-muriate hydrargyri et gambogia; litus mercurialis; epi-

spastica invicem excipientia et applicationes frigidae capiti; errhina, ut subsulphas hydrargyri flavus, proportione grani ad sacchari in pulverem triti grana quindecim, sensim in nares inflatu; ictus electrici lenes ad caput admoti; in secundo et ultimo stadio, cinchona, vinum, opium et digitalis.

CAP. V. HYDROTHORAX.

SYMPTOMATA.

Dyspnoea, pectoris oppressio molesta; faciei pallor; pedum oedemata; urina parca; sitis magna; tussis in initio siccata, postea humida; extrema frigida; brachiorum torpor; decubitus difficultis; subita et spontanea ex somno cum palpitatione excitatio; aqua in pectore fluctuans: si unum latus plus quam alterum afficiatur, ad latus affectum inclinat aeger, et brachium ejusdem lateris magis est torpidum.

DIAGNOSIS.

Ab empyemate internoscitur quod in eo inflammatio fuit, febris hectica est, quibus hydrothorax caret.

CURA.

Diuretica, praecipue digitalis et scilla, opio et hydrargyri praeparationibus conjunctis; epispastica pectori; fontanelae, et omnia ad anascarcam aptata: Paracentesis.

CAP. VI. ASCITES.

SYMPTOMATA.

Abdominis intumescentia tensa, aequalis, vix elastica, ad ictum fluctuosa: urina parca, admodum rubra; cutis arida; sitis perpetua; alvus pertinaciter astricta; vultus pallidus et tumidus; tussis sicca; dyspnoea; somnolentia; dolor in epigastrii regione lacinans.

DIAGNOSIS.

Ab tympanitide aquae fluctuantis sensu dignoscitur, ubi venter altera manu pulsatur, altera premitur; in hydrope cystica intumescientia non aequalis est sed circumscripta, et systematis vigor miuus est imminutus.

PROGNOSIS.

Vires multum imminutae; somnolentia; coma; respiratio valde laboriosa; infausta sunt indicia.

CURA.

Emetica, praecipue sulphas cupri; diuretica; cathartica nisi alvus sit soluta; abdominis frictio diurna digitis in oleo primum mersis; paracentesis et alia remedia antea recensita ad hydropem idonea: si ab statu viscerum morboso oriantur, hydrargyri praeparationes sunt utendae: an digitalis?

INTUMESCENTIÆ SOLIDÆ.

CAP. VII. RACHITIS.

SYMPTOMATA.

Plerumque inter nonum aetatis mensem, annumque secundum, cum musculturum flacciditate, vultu pallido, tumido, motus et exercitationis aversatione comparet: tunc caput, praecipue sinciput, artusque magnopere tument; sternum acutum et prominens evadit, costae depressae, ossa mollita, curvata; abdomen tumidum fit et tensum; alvus soluta; caetera marcescunt; dentes tarde erumpunt, et cito dilabuntur; acumen ingenii præmaturum appareat.

CAUSE.

Debilis, aer humidus et impurus; lac minus nutriend; labes haereditaria; habitus corporis scrofulæ abnoxius. Cau-

(172)

sa proxima esse videtur materiei osseae defectus.

C U R A.

Emetica lenia ; tonica , ut ferri et zinci praeparationes rheo palmato conjunctae ; corporis pannis laneis frictio : exercitatio ; diaeta nutriendis ; balneum frigidum et aeri sicco expositio. Prophylaxis exercitatione et lavatione frigida est petenda : an halneum tepidum ?

ORDO III. IMPETIGINES.

CHARACTER.

Cachexiae , cutem et externum corpus praecipue deformantes.

CAP. I. SCROFULA.

SYMPTOMATA.

Glandularum conglobatarum , praesertim in collo nonnunquam in artibus ,

tumores , doloris expertes , duri et digido prementi cedentes , tandem in ulcera mali moris , ad sanandum perdifficilia , abeuntes ; labium superius et nasi columna tumentes : facies florida ; oculi plerumque magni , debiles ; cutis laevis ; abdomen tumidum ; pubertate ineunte frequenter sese abscondit.

C A U S A.

Labes haereditaria ; aer impurus , humidus , nebulosus ; systematis lymphatici constitutio certa.

C U R A.

Ponto immersio vasto : aquae marinae , chalybeatae , sulphureae ; digitalis ; solutio muriatis barytae ; carbonas sodae cum cinchona forma electuarii , in prioris proportione drachmarum duarum ad posterioris unciam ; opium in dosi grani partis quartae ad dimidiam bis indies ; ferri et zinci praeparationes : applicatio-

nes topicae , quales aqua marina , acetitis plumbi solutio in proportione unicæ acetitis plumbi ad aquae libram ; cinchonae pulvis et oxidum plumbi album in prioris drachmarum septem proportione , ad posterioris drachmam ; vel oxidum zinci ulcera inspergendum est ; cataplasma ex rumice acetosa confecta ulceribus et tumoribus . Solutio muriatis calcis multum mihi visa est profuisse . An gas oxygenum ? an electricitas ?

CAP. II. SYPHILIS.

CHARACTER.

Morbus contagiosus , post concubitum impurum , oriens , cum circa colis glandem vel pudenda pruritu , quem subsequuntur ulculscula venerea (chancres appellata) , bubones , tonsillarum , faucium , cutisque ulcera , praesertim ad marginem capillitii , papulae corymbosae in crustas et in ulcera crustuosa abeuntes ; ossium praesertim corpore incalescente dolores ; nodi exostoses , etc .

CURA.

Hydrargyrus interne et externe est adhibendus donec sapor metallicus in ore excitatur , vel gingivae tenere redundantur vel salivatio lenis inducitur ; ulcerata quam primum sunt sananda applicatione nitratis argenti , aeruginis pp. , unguenti hydrargyri vel nitratis hydrargyri : ad bubones recentes hirudines parti tumefactae sunt applicandae et postea vesicatorium ; opium , decoctum sarsaparillae simplex et compositum medelam accelerant ; ad tonsillarum ulcerationem , fumigatio cum oxido hydrargyri cinereo , sulphurato hydrargyri rubro , vel gargarismatibus ex muriate hydrargyri paratis :: ad verrucas , pulvis sabinae , muriatas ammoniae , tinctura muriatis ferri , etc. :: lobelia syphilitica et acidum nitrosum nunc temporis beneficio saepe utuntur.

CAP. III. GONORRHŒA.

SYMPTOMATA.

Tribus , quatuorve diebus a contagione accepta , pruritus insolitus , circa penis glandem , quae tumida et tensa est, persistit ; os urethrae solito apertius est et tumidum ; guttulae materiei purisformis ex ea exprimi possunt ; profluvium magis tenue , quantitate auctum , colore varians et saepe sanguine tinctum evadit ; urina dolore et ardore redditur ; morbo ingravescente , penis incurvatio dolorifica vel chordæ , phymosis , paraphymosis , hernia humoralis , urethrae strictura , etc. superveniunt .

CURA.

Injectiones ex sulphate zinci , acetite plumbi , et similibus , vel potius ex muritate hydrargyri in proportione grani unius , ad aquae rosac unicas octo , sae-

peindies sunt utendae ; si adsit inflammatio vehemens , oleum tepidum , mucilago mimosae niloticae vel opii solutio est injiciendum ; regimen antiphlogisticum stricte est administrandum ; venaesectio ; enemata emollientia ; laxantia ; diluentia ; applicationes sedativa*e* parti ; sacculus suspensorius per totum morbi decursum uti debet ; ad incurvationem penis dolorificam opium interne , vel litus cum unguento ex camphorae drachmis duabus solutae spiritus vinosi guttis paucis et axungiae uncia dimidia confecto : ad herniam humoralem , hirudines parti dolenti , enemata laxantia , balneum tepidum , opiata ; cataplas mata emollientia scroto , applicationes sedativa*e* peni ex acetite plumbi paratae , et in lecto aegri detentio : si partes durae remanerent litus mercurialis , cicuta et decoctum sarsaparillae compositum utenda sunt ; tonus partibus affectis redditur injectionibus astringentibus.

CAP. IV. SCORBUTUS.

SYMPTOMATA.

Bassitudo inusitata ; motui aversatio ,
 animi dejectio ; facies pallida , tumida .
 magna virium prostratio ; animi deli-
 quium post motum ; cordis palpitatio ; do-
 lores muscularum vagi saepe sunt mor-
 bi prima indicia ; sanguis dissolutus e-
 givginis laxis , spongiosis , promanat ;
 anhclitus gravissime foetet ; gingivae ex-
 ulcerantur , dentes nudantur et vacil-
 lant ; cutis sicca et aspera est in initio ,
 dein maculae latae , lividae praesertim
 in cruribus et femoribus , rarius in fa-
 cie , et ulcera in totum corpus sese ma-
 nifestant ; membra tument , dolent , po-
 plitum praesertim tendines rigent ; cru-
 raque versus femora retrahunt ; in mor-
 bo inveterato haemorrhagiae ab partibus
 corporis variis erumpunt , ab ore , na-
 ribus , ano , digitis etiamque extremis ;
 pulsus plerumque debilis est ; urina ru-

bra, foetida et post aliquot horas pellicula oleosa obtecta; lingua fere naturaliter se habet; alyus per totum morbi decursum saepe pertinaciter astringitur, nonnunquam vero diarrhoea torminibus comitata vexat.

CAUSA.

Causae remotae sunt: victus animalis putrescens, salitus; rei vegetabilis inopia; exercitatio omissa; frigus; humor; affectus animi deprimentes; immundities. Causa proxima esse putatur sanguinis status praeternaturaliter salinus.

PROGNOSIS.

Diarrhoea mitis; cutis mollis, humida aeger facilius motum vel exercitacionem tolerans, felicem eventum praenuntiant.

C U R A.

Cibus recens animalis et vegetabilis ; fructus horaei , subacidi ; potus fermentati , quales succus e pomis expressus ; bynes infusum ; cerevisia bene lupulata ; cerevisia ex abie confecta ; mundities summa ; stimulantia , ut , cochlearia armoracia , sinapis alba , etc. vinum ; ferri praeparationes ; cinchona ; acida mineralia ; opium : ad gingivas spongiosas , gargarismata ex aluminis solutione confecta , in proportione sulphatis aluminae drachmarum quatuor ad aquae uncias sex ; cataplasmata ex oxali acetosella ad ulcera sunt admovenda : super nitras potassae in acido acetoso soluta summo cum fructu usurpatum fuit , in proportione unciae dimidiae nitratis potassae ad uncias quatuor acidi acetosi , cuius dosis est ob uncia dimidia ad uncias duas , bis , ter , quaterve in die ; ulcera solutione sunt lavanda : gas oxygenium .

CAP. V. ELEPHANTIASIS.

CHARACTER.

Morbus contagiosus ; cutis crassa , rugosa , aspera , unctuosa , pilis destituta ; in extremis artibus tactus imminutus , vel abolitus ; facies tuberibus deformis ; anhelitus valde foetidus ; vox rauca et nasalis ; pulsus tardus et debilis ; morbo ingravescente , artus , putredine corrupti , decidunt.

CURA.

Sanguinis missio ; cathartica lenia ; balneum tepidum ; diaeta nutriens concoctu facilis ; antimonii et hydrargyri praeparationes , praecipue murias hydrargyri ; oxidum arsenici ; tinctura veratri albi . acidum sulphuricum ; decoctum guaiaci ; sarsaparillae compositum , et ulmi libere , tinctura meloes vesicatorii ; jus viperinum ; cinchona.

CAP. IV. LEPRA.

CHARACTER.

Cūtis escharis albīs , furfuraceis , rīmosis , aspera , aliquando subtus humida , pruriginosa ..

CURA.

Fontanellae ; liquoribus fermentatis abstinentia ; exercitatio lenis ; antimonii praeparationes :: decoctum ulmi et alia remedia supra recensita. An trartris antimonii refracta dosi cum opii quantitate exigua ? An acidum nitricum ?

CAP. III. ICTERUS.

SYMPTOMATA .

Hypocondrii dextri dolor obtusus , gravitatis et tensionis circa praecordia sensus ; corporis universi torpor et lassitu-

do ; cutis pruritus et ariditas ; oris amaritudo ; nausea : saepe vomitus ; oculorum cutisque flavedo ; faeces albidae ; urina obscure rubra , immissa colore luteo tingens ; alvus plerumque astricta , nonnunquam pyrexia .

C A U S E .

Causae remotae sunt , calculi e. bile confecti , bilis in intestina descensum prohibentes ; ductus spasmi ; tumores hepatis vel partium vicinarum ductum communem cholædochum comprimentes ; bilis in intestinis retentio : Causa proxima est bilis absorptio vel regurgitatio in sys tema sanguiferum .

C. U. R. A.

Si ab calculis vel spasmo oriatur , eadem remedia sunt usurpanda ; si dolor hypochondrii dextri graviter urgeat , vel si ulla pyrexiae signa adsint , sanguinis aegrotos detrahatur ; balneum tepidum ,

emetica lenia ; opiate vel hyoscyamus ; fomenta ; epispastica ; laxantia , qualia aloë , oleum e seminibus riciui , sapo , carbonate potassae purissimo et amaris conjunctis ; enemata emollientia ; diluentia tepida ; aether sulphuricus cum ovo-rum vitellis : ictus electrici ductum communēm choledochum transmissi , postea aqua seltzerana , cinchona et ferri præparations : si ab bilis in intestinis re-tentione proveniat , alvi purgatio ; si ab tumoribus vel visceribus morbosis oriatur , hydrargyrus , cicuta , etc.

LOCALES

CLASSIS IV. LOCALES.

CHARACTER.

Partis, non totius corporis, affectio.

ORDO I. DYSÆSTHESIÆ.

CHARACTER.

Sensus depravati aut deleti, ex organorum externorum vitio.

CAP. I. AMAUROSIS.

CHARACTER.

Visus imminutus vel prorsus abolidus, sine vitio oculi evidente, plerumque cum pupilla dilatata et immobili.

C A U S E .

Causae remotae sunt , cerebri compressio ab congestione vel vi externa ; atonia vel nervorum opticorum paralysis . Causa proxima est retinae insensibilitas ..

C U R A :

Si ab compressione vel congestione proyeniat , remedia iis aptata sunt usurpanda ; si ab atonia vel paralysi nervorum opticorum oriatur ; stimulantia sunt utenda , qualia , epispastica temporibus ; electricitas et scintillae et ictus ; errhinata , ut sub-sulphas hydrargyri flavus cum pulveris glycyrrhizae octuplo commixtus ; remedia stimulantia interna ad paralysin idonea sunt administranda .

CAP. II. DYSECOEA.

CHARACTER..

Auditus imminutus vel abolitus .

CAUSE..

Vitium organicum; nimia auris siccitas; cerumen multum induratum; membranarum inflammatio; eustachii tuba obstructa; atonia vel paralysis nervi acustici; syphilis ..

CURE.

Si ab vitio organico proveniat, immedicabilis est: si ab nimia auris siccitate vel cerumine indurato, solutio muriatis sodae et emollientia sunt utenda: si ab inflammatione, sanguinis missione topica et alia inflammationi aptata sunt adhibenda, et aer externus est excludendus: si ab eustachii tuba obstru-

cta , gargarismata , injectiones per syringem ; errhina , ut pulvis asari et sub-sulphas hydrargyri flavus : ubi ex magno fragore melius audit , jubendus est , ut obturatis ore et naribus , aerem expiratum vi , in eustachii tubam impellat , quo subito saepe auditus restitutus : si ab atonia vel paralysi , stimulantia , electricitas : si ab lue venerea , hydrargyri praeparationes sunt utendae.

ORDO II. APOGENOSES .

CHARACTER.

Fluxus sive sanguis sive humores alii , solito uberius profluens , sine pyrexia impetuwe fluidorum aucto .

CAP. I. ENEURESIS .

CHARACTER.

Urinae e vesica fluxus involuntarius non dolens .

C A U S E.

Vesicae sphincteris atonia vel paralysis; irritatio vel compressio . . .

C U R A.

Atonia , perinaci lavatione frigida , epispasticis ei admotis et tonicis internis est amovenda ; paralysis est depellenda epispasticis , electricitate et stimulantibus : si ab irritatione vel compressione oriatur , remedia iis propria sunt administranda .

ORDO III. EPISCHESES.

CHARACTER.

Excernendorum surpressiones.

CAP. I. ISCHURIA RENALIS.

CHARACTER.

Urinae suppressio absoluta; praegresso renum morbo, cum dolore vel molesto gravitatis sensu in regione renum, femoris stupore, nausea saepe vomitu, et sine hypogastrii tumore vel ad mingendum stimulo.

CAUSE.

Nephritis; calculi; sanguis concrematus vel pus in renum pelvi, spasmi vel renum paralysis.

CURA.

Si ab nephritide oriatur, remedia idonea sunt utenda quae aliubi recensentur: si ab calculo, sanguinis missio plerumque nocet, nisi adsit plethora; aliter non, balneum tepidum; opiate,

enemata emollientia laxantia vel ex pinii laricis resina liquida parata ; diluentia ; antispasmodica externe ; alvi lenis purgatio cum oleo olivae vel oleo e semibus ricini : si ab spasio , eadem remedia convenient : si ab sanguine congrumato , balneum tepidum ; anodyna ; enemata etc. ; si ab paralysi , electricitas ; stimulantia ; episistica etc.

CAP. II. ISCHURIA URETERICA.

CHARACTER.

Urinae suppressio absoluta ; praegresso renum morbo , cum doloris vel molestiae sensu in quadam ureteris parte , et sine hypogastrii tumore vel ad mingendum stimulo : Causas easdem ut prior agnoscit , et candem medendi rationem postulat .

CAP. III. ISCHURIA VESICALIS.

CHARACTER.

Urinae suppressio cum hypogastrii tumore , vesicae figura primo referente , dolore ad cervicem vesicae vel ponebris sensu molesto , et frequenti ad mingendum stimulo .

CAUSE.

Cystitis ; fibrarum musculosarum vel tunicarum vitium ; calculi ; spincteris vesicae spasmus ; vesicae paralysis ; vesica diutius distenta ; sanguis grumosus , mucus vel pus circa vesicae collum ; scybala ; flatus ; abscessu ; haemorrhoides ; graviditas .

CURA.

Si adsit inflammatio , sanguis est detrahendus , aliter non ; balneum tepi-

dum utendum est; enemata laxantia; pubis frictio cum camphora in oleo soluta; opiata; his nihil valentibus, catheter immitti debet, vel punctura vasicae: an emeticum? si ab tonicarum vitio proveniat, hydrargyrus, cicuta et electricitas; si ab calculis, lithontriptico, ut aqua kali puri, aqua super-carbonatis potassae vel sodae, enemata anodyna, lapis suillus, uva ursi; et his nihil juvantibus, peragenda sit lithotomia: si ab spasmo, venaesectio, balneum tepidum, optata, enemata emollientia: si ab paralysi, remedia antea recensita: si ab vesica diutius distenta, applicationes frigidae hypogastrio sunt admovendae: si ab sanguine grumoso, muco vel pure, balneum tepidum; enemata; opiata: si ab graviditate, catheter adhibendum est: si ab aliis causis, remedia antea memorata quae iis sunt idonea usurpanda sunt.

CAP. IV. ISCHURIA URETHRALIS.

CHARACTER.

Urinae suppressio cum tumore hypogastrii circumscrip^to , frequenti ad mingendum stimulo , et dolore in aliqua parte urethrae.

CAUSÆ.

Perinaei tumor ; calculus urethrae impactus ; sanguis grumosus , mucus vel pus ; urethrae inflammatio ; strictura ; carunculae ; phymosis ; scirrus vel glandulae prostatae vitium .

CURA.

Causæ remotæ sunt amovendæ ; si ab calculo oriatur semicupium , fomenta , opia , enemata emollientia , demulcentia mucilaginosa , sunt utenda ; his nihil vatentibus , extrahendus est calculus : si ab astrictura proveniat , tinctura muriatis ferri , in dosi guttarum decem omni horæ sexta parte , donec solvitur spasmus , est utenda : Plurimæ aliae cauſae opem chirurgi postulant : urina arte est evacuanda modis propriis.

(195)

ORDO IV. DIALYSES.

CHARACTER.

Solutio continua , visu tactuve manifesta.

CAP. I. HERPES.

CHARACTER.

Vesiculae cuticulares humore aqueo plenae , vel ulcuscula plurima gregalia, pruriginosa , serpentia ; nunc humida , nunc sicca in squamas furfuraceas raro crustaceas abeuntia.

ACURIA.

Acidum sulphuricum ; tinctura meloes vesicatorii ; tinctura veratri ; aqua calcis ; decoctum ulmi ; pilulae sub-muriatis hydrargyri compositae (vulgo Plummeri dictae) : ulcera sunt inungenda unguento nitratis hydrargyri vel acido sulphurico octuplo ponderis unguenti adipis suillae commisto , vel sunt lavanda sulphatis ferri solutione , vel sulphureti potassae lotione .

(196)

CAP. II. TINEA.

CHARACTER.

In cute capillata ad radices capillorum ulcuscula , humorem in crustam albam friabilem abeuntem fundentia .

CURA.

Capitis rasura ; balneum calidum ; epispastica ; fontanellae ; unguentum nitratris hydrargyri ; emplastrum picis nigrae ; solutio sulphureti potassae in proportione drachmarum duarum ejus ad aquae libram , et remedia interna ad herpem idonea .

CAP. III. PSORA.

CHARACTER.

Pustulae et ulcuscula lecti calore valde pruriginosa , contagiosa , digitos internos , carpos , artusque infestantia.

CURA.

Frictio cum unguento sulphuris vel lavatio corporis partium affectarum oxi- di arsenici vel muriatis hydrargyri so- lutione , vel acidum sulphuricum interne .

INDEX MORBORUM.



A

A		
MAUROSIS.		<i>pag.</i> 185
Amenorrhoea.		104
Anasarca.		162
Aphthae.		188
Apoplexia.		115
Ascites		169
Asthma		133
Atrophia Lactantium.		158

C

Catarrhus.		109
Cholera		142
Chorea		128
Colica		139
— Pictonum.		141
Cynanche maligna.		28
— parotidaea.		54
— pharyngaea.		ib.
— tonsillaris.		26
— trachealis.		51.
Cystitis.		54

D.

Diabetes.	146
Diarrhoea.	144
Dysecœa.	187
Dysenteria.	111
Dyspepsia.	121

E.

Elephantiasis.	181
Emphysema.	160
Enteritis.	45
Eneuresis.	188
Epilepsia.	129
Epistaxis.	91
Erysipelas.	83
Erytema.	20

F.

Febris, remittens.	16
— haectica.	17

G.

Gastritis.	42
Gonorrhœa.	176

H.

Haematemesis.	107
Haematuaria	108
Haemoptysis	92
Haemorrhagia	89
Haemorrhosis.	99
Hectica.	17

Hepatitis	47
Hepatitis chronica	50
Herpes	195
Hydrocephalus	165
Hydrophobia	149
Hydrothorax	168
Hypocondriasis	124
Hysteria	147
Hysteritis	53
K	
Icterus	182
Intermittentes	1
Ischuria renalis.	190
— ureterica.	191
— urethralis.	194
— vesicalis.	192
L	
Lepra.	182
Leucorrhoea.	105
M	
Mania.	153
Melancholia.	151
Menorrhagia.	101
Miliaria.	85
N	
Nephritis.	51
O	
Ophthalmia membranarum.	21
— tarsi.	25

P

Palpitatio.	132
Paralysis	118
Pemphigus.	87
Peripneumonia notha	40
Pertussis.	136
Pestis.	80
Phlegmone.	18
Phrenitis.	23
Phthisis.	94
Pneumonia.	35
Podagra.	59
— aberrans	66
— atonica	63
— retrocedens.	64
Psora	197
Pyrosis.	138

Q

Quartana	5
Quotidiana	ib.

R

Rachitis.	171
Remittens.	16
Rheumatismus acutus,	58
— chronicus,	58
Rubcola.	75

(201)
S

Scarlatina	77
— <i>anginosa</i>	78
Scorbutus.	178
Screfula	172
Splenitis	51
Suppressio mensium-	106
Syncope.	120
Synocha	5
Synochus.	16
Syphilis.	174

T

Tabes.	157
Tertiana.	1
Tetanus.	126
Tinea	196
Tympanites.	161
Typhus gravior.	12.
— <i>mitior.</i>	8

U

Urticaria.	87
-------------------	-----------

V

Varicella.	72
Variolae benignae.	67
— <i>malignae.</i>	70

MEDICAMENTORUM NOMINA

MUTATA ET NOVA.

Nomina Mutata. Nomina nova.

<i>ABSYNTIUM..</i>	<i>Artemisia absinthium..</i>
<i>Acetosa.</i>	<i>Rumex acetosa..</i>
<i>Acetum vini.</i>	<i>Acidum acetosum.</i>
<i>Acidum vitrioli- cum..</i>	<i>Acidum sulphuri- cum..</i>
<i>— vitrioli aroma- ticum..</i>	<i>— aromaticum..</i>
<i>Ærugo..</i>	<i>Sub-acetis cupri..</i>
<i>Æther vitriolicus..</i>	<i>Æther sulphuricus..</i>
<i>Æthiops mineralis..</i>	<i>Sulphuretum hy- drargyri nigrum..</i>
<i>Agaricus.</i>	<i>Boletus igniarius..</i>
<i>Alkali causticum.</i>	<i>Potassa..</i>
<i>— fixum fossile..</i>	<i>Carbonas sodae..</i>
<i>— vegetabile..</i>	<i>— potessae: impu- rus..</i>
<i>— volatile..</i>	<i>— ammoniae..</i>
<i>Alumen..</i>	<i>Sulphas aluminae..</i>
<i>— ustum..</i>	<i>— exsiccatum..</i>
<i>Ammonia muriata..</i>	<i>Murias ammoniae..</i>
<i>— praeparata..</i>	<i>Carbonas ammoniae..</i>
<i>Amygdala dulcis..</i>	<i>Amygdalus communis..</i>

Nōmina mutata.

Nomina nova.

*Angelica sativa.*Angelica archange-
lica.*Anisum.*

Pimpinella anisum.

*Antimonium.*Sulphuretum anti-
monii.— *calcareo phos-
phoratum.*Oxidum antimonii
cum phosphate
calcis.— *muriatum.*

Murias antimonii.

— *tartarisatum.*

Tartris antimonii.

*Aquae ammoniae.*Aqua carbonatis
ammoniae.— *acetatae.*— acetis ammo-
niae:— *causticae.*

— ammoniae.

— *cupi vitriolati
composita, vel
aqua styptica.*Solutio sulphatis
eupri composita.— *lixivia caustica*

Aqua potassae.

— *zinci vitriolati.*Solutio sulphatis
zinci.*Arabicum gummi.*Gummimimosae Ni-
loticae.*Argentum nitra-
tum.*

Nitras argentii.

— *vivum.*

Hydrargyrus.

Arsenicum.

Oxidum arsenici.

<i>Assa foetida.</i>	Gummi-resina ferulae assae. foetidae.
<i>Aurantium Hispalense.</i>	Citrus aurantium.
<i>Axungia poreina.</i>	Adeps suis scrofae.
<i>Balsamum Canadense.</i>	Resina liquida pini balsamcae.
<i>Balsamum Copabae.</i>	Resina liquida copaiferae officinalis.
— <i>Gileadense.</i>	— amyridis Gileadensis.
— <i>Peruvianum.</i>	Balsamum myroxili Peruiferi.
— <i>Tolutanum.</i>	— Toluiferae balsami.
<i>Balsamum raumaticum.</i>	Tinctura benzoin composita.
<i>Bardana.</i>	Arctium lappa.
<i>Barilla.</i>	Carbonas sodae impurus.
<i>Barytes.</i>	— barytae.
<i>Belladonna.</i>	Atropa belladonna.
<i>Benzoinum.</i>	Balsamum styracis benzoin.

<i>Bistorta.</i>	Polygonum bistorta
<i>Borax.</i>	Boras sodae.
<i>Butyrum antimoni- nii.</i>	Murias antimonii..
<i>Cajeputa..</i>	Melaleucadendion..
<i>Calamus aroma- ticus.</i>	Acorus calamus..
<i>Calamelas..</i>	Sub-murias hydrar- gyri..
<i>Calx viva.</i>	Calx..
<i>Cancrorum lapilli..</i>	Carbonas calcis du- rior..
<i>Cantharis..</i>	Meloe vesicatorius..
<i>Cardomum minus..</i>	Amommum repens.
<i>Carduus benedi- ctus..</i>	Centaurea benedicta..
<i>Carica..</i>	Fructus fici caricac..
<i>Curvi..</i>	Carum carui..
<i>Caryophylla aro- matica.</i>	Caryophyllus aro- maticus.
<i>— rubra..</i>	Dianthus caryo- phyllus..
<i>Cascarilla.</i>	Croton eleutheria..
<i>Cassia fistularis..</i>	Cassia fistula..
<i>— lignea..</i>	Laurus cassia..

Nomina mutata. Nomina nova.

<i>Catechu.</i>	Mimosa catechu.
<i>Causticum com- mune acerri- mum.</i>	Potassa.
— <i>mitius.</i>	— cum calce.
— <i>lunare.</i>	Nitras argenti.
<i>Centaurium mi- nus.</i>	Chironia centau- rium.
<i>Cerussa..</i>	Oxidum plumbi al- bum, <i>vel</i> Car- bonas plumbi.
— <i>acetata.</i>	Acetis plumbi.
<i>Chamaemelum..</i>	Anthemis nobilis.
<i>Cicuta.</i>	Conium maculatum
<i>Cinnabaris facti- tia..</i>	Sulphuretum hy- drargyri rubrum.
<i>Cinara hortensis..</i>	Cinara scolymus.
<i>Cineres clavellati..</i>	Carbonas potassae impurus.
<i>Cinnamomum..</i>	Laurus cinnamo- mum.
<i>Coccinella.</i>	Coccus cacti.
<i>Colocynthis..</i>	Cucumis colocyn- this.
<i>Confectio Japoni- ca..</i>	Electuarium mi- mosae catechu.

Nomina mutata. Nomina novae.

<i>Contrajerva.</i>	<i>Dorstenia contra-</i> <i>jerva.</i>
<i>Cortex Peruvia-</i> <i>nus.</i>	<i>Cortex cinchonae</i> <i>officinalis.</i>
<i>Creta alba.</i>	<i>Carbonas calcis</i> <i>mollior.</i>
<i>Crocus antimoniī.</i> — <i>metallorum.</i>	<i>Oxidum antimoniī</i> <i>cum sulphure per</i> <i>nitratum potas-</i> <i>sae.</i>
<i>Crystalli tartari.</i>	<i>Super-tartris po-</i> <i>tassae.</i>
<i>Cucumis agrestis.</i>	<i>Momordica elate-</i> <i>rium.</i>
<i>Cuprum ammo-</i> <i>niaeum.</i>	<i>Ammoniaretum cu-</i> <i>pri.</i>
<i>Cuprum vitriola-</i> <i>tum.</i>	<i>Sulphas cupri..</i>
<i>Cynosbatos.</i>	<i>Rosa canina.</i>
<i>Daucus silvestris.</i>	<i>Daucus catota..</i>
<i>Decoctum chame-</i> <i>maeli vel com-</i> <i>mune.</i>	<i>Decoctum anthemii-</i> <i>dis nobilis.</i>
— <i>lignorum.</i>	— <i>guaiaci compo-</i> <i>situm.</i>
<i>Dens leonis.</i>	<i>Leontodon taraxa-</i> <i>cum.</i>

Nomina Mutata. Nomina nova.

<i>Elaterium.</i>	Succus spissatus memordicae elaterii.
<i>Electuarium lenitivum.</i>	Electuarium cassiae sennae.
<i>Elixir paregarium.</i>	Tinctura opii ammoniata.
— <i>sacrum.</i>	— rhei et aloes.
— <i>salutis.</i>	— sennae composita.
— <i>stomachicum.</i>	— gentianae composita.
<i>Emplastrum adhaesivum.</i>	Emplastrum resinosum.
— <i>cereum.</i>	— simplex.
— <i>lithargyr. vel commune.</i>	— oxidi plumbi semivitrei.
— <i>lithargyri compositum vel roborans.</i>	— oxidi ferri rubri.
— <i>vesicatorium.</i>	— meloes vesicatori.
<i>Emulsio communis.</i>	Emulsio amygdalae communis.
<i>Ferrum ammoniacum.</i>	Murias ammoniae et ferri.
<i>Ferri rubigo.</i>	Carbonas ferri.

Nomina mutata. Nomina nova.

<i>Ferri squamae</i>	Oxidum ferri nigrum purificatum.
— <i>praeparatae.</i>	— <i>praeparatum.</i>
<i>Ferrum vitriolatum.</i>	Sulphas ferri.
— <i>ustum.</i>	Oxidum ferri rubrum.
<i>Filix mas.</i>	Polypodium filix mas..
<i>Flores martiales.</i>	Murias ammoniae et ferri.
<i>Flores sulphuris.</i>	Sulphur sublimatum.
<i>Flores zinci.</i>	Oxidum zinci.
<i>Foeniculum dulce.</i>	Anethum foeniculum.
<i>Galbanum.</i>	Gummi-resina bonis galbani.
<i>Genista.</i>	Spartium scoparium.
<i>Granata majus.</i>	Punicum granatum.
<i>Gummi Arabicum.</i>	Gummi mimosae Niloticæ:
<i>Helleborus albus.</i>	Veratrum album.
<i>Hepar sulphuris.</i>	Solphuretum potassæ.

<i>Hippocastanum.</i>	<i>Æsculus Hippocastanum.</i>
<i>Hydrargyrus acetatus.</i>	<i>Acetis hydrargyri.</i>
— <i>muriatus corrosivus.</i>	<i>Muria hydrargyri.</i>
— <i>mitis.</i>	<i>Sub-murias hydrargyri sive calomelas.</i>

<i>præcipatus.</i>	<i>præcipitatus.</i>
<i>Hydrargyrus nitratius ruber.</i>	<i>Oxydum hydrargyri rubrum per acidum nitricum.</i>
— <i>præcipitatus cinereus.</i>	<i>Oxidum hydrargyri cinereum.</i>
— <i>sulphuratus niger.</i>	<i>Sulphuretum hydrargyri nigrum.</i>
— <i>vitriolatus flavus.</i>	<i>Sub-sulphas hydrargyri flavus.</i>
<i>Infusum amarum.</i>	<i>Infusum gentianae compositum.</i>
— <i>rosarum.</i>	— <i>rosae Gallicae.</i>
<i>Jalapa.</i>	<i>Convolvulus jalapa.</i>
<i>Lapis calaminaris.</i>	<i>Carbonas zinci impurus.</i>
<i>Lavendula.</i>	<i>Lavandula spica.</i>

Nomina mutata.

Nomina nova.

Laudanum liquidum. Tinctura opii.

Lignum Campechense. Lignum haematoxyli Campechianni.

Limon.

Citrus medica.

Linimentum andynum vel opiatum.

Tinctura saponis.

— *saponaceum.*

Tinctura saponis.

— *volatile.*

Oleum ammonium.

Eythargyrus.

Oxidum plumbi semivetreum.

Lixiva acetata.

Acetis potassae.

— *e tartaro.*

Carbonas potassae purissimus.

— *purificata.*

Carbonas potassae.

— *tartarisata.*

Tartris potassae.

— *vitiolata.*

Sulphas potassae.

— *sulphurea.*

— cum sulphure.

Lixivium causticum.

Aqua potassae.

Magnesia alba.

Carbonas magnesiae.

— *usta.*

Magnesia.

— *vitiolata.*

Sulphas magnesiae.

*Nomina mutata.**Nomina nova.*

<i>Majorana.</i>	<i>Origanum majorana</i>
<i>Manna.</i>	<i>Succus concretus fraxini orni.</i>
<i>Marmor album.</i>	<i>Carbonas calcis du- rior.</i>
<i>Mastiche.</i>	<i>Resina pistaciae len- tisci.</i>
<i>Melampodium.</i>	<i>Helleborus niger.</i>
<i>Mercurius.</i>	<i>Hydrargyrus.</i>
— <i>praecipatus ru- ber.</i>	<i>Oxidum hydrargyri rubrum.</i>
— <i>sublimatus cor- rosivus.</i>	<i>Murias hydrargyri.</i>
<i>Mezereum.</i>	<i>Daphne mezereum.</i>
<i>Minium.</i>	<i>Oxidum plumbi ru- brum.</i>
<i>Muria.</i>	<i>Murias sodae.</i>
<i>Nasturtium aqua- ticum.</i>	<i>Sisymbrium nastur- tium.</i>
<i>Nitrum.</i>	<i>Nitras potassae.</i>
<i>Nox moschata.</i>	<i>Nucleus fructus my- risticae moscha- tae.</i>
<i>Olea stillatitia.</i>	<i>Olea volatilia.</i>
<i>Oleum succini re- ctificatum.</i>	<i>Oleum succini pu- rissimum.</i>
<i>Oleum terebinthi- nae rectificatum.</i>	<i>Oleum volatile pi- ni purissimum.</i>

*Nomina mutata.**Nomina nova.*

<i>Olibanum.</i>	Gummi-resina juniperi lyciae.
<i>Oliva.</i>	Olea Europaea.
<i>Palma.</i>	Cocos butyracea.
<i>Petroleum Barbadense.</i>	Bitumen petroleum.
<i>Petroselinum.</i>	Apium petroselinum.
<i>Pilulae cupri.</i>	Pilulae ammoniareti cupri.
— <i>thebaicae.</i>	— opiateae.
<i>Pimenta.</i>	Myrtus pimenta.
<i>Piper Indicum.</i>	Capsicum annum.
— <i>Jamaicense.</i>	Fructus myrti pimentae.
<i>Pix Burgundica.</i>	Resina sponte concreta pini abietis.
<i>Pix liquida.</i>	Resina empyreumatica pini silvestris.
<i>Plumbeum ustum.</i>	Oxidum plumbi semivitreum.
<i>Potio cretacea.</i>	Potio carbonatis calcis.
<i>Prunus Gallica.</i>	Prunus domestica.
<i>Pulegium.</i>	Mentha pulegium.

Nomina mutata. Nomina nova.

<i>Pulvis antimonia-</i>	<i>Oxidum antimonii</i>
<i>lis.</i>	<i>cum phospatae calcis.</i>
<i>— cretaceus.</i>	<i>Pulvis carbonatis calcis compositus.</i>
<i>— Doveri.</i>	<i>— ipecacuanhae et opii.</i>
<i>Pyrethrūm.</i>	<i>Anthemis pyrethrūm.</i>
<i>Raphanus rustica-</i>	<i>Cochlearia armora-</i>
<i>nus.</i>	<i>cia.</i>
<i>Rhabarbarum.</i>	<i>Rheum palmatum.</i>
<i>Resina alba.</i>	<i>Resina pībi.</i>
<i>Rosa pallida.</i>	<i>Rosa centifolia.</i>
<i>— rubra.</i>	<i>— Gallica.</i>
<i>Rubigo ferri pre-</i>	<i>Carbonas ferri pre-</i>
<i>parata.</i>	<i>paratus.</i>
<i>Sabīna.</i>	<i>Juniperus sabina.</i>
<i>Saccharūm satur-</i>	<i>Acētis plumbi.</i>
<i>ni.</i>	
<i>Sal alkalinus fi-</i>	<i>Carbonas sodae.</i>
<i>xus fossilis.</i>	
<i>— vegetabilis.</i>	<i>— potassae.</i>
<i>— ammoniacus.</i>	<i>Murias ammoniae.</i>
<i>— catharticus a-</i>	<i>Sulphas magnesiae.</i>
<i>marus.</i>	
<i>— cornu cervi.</i>	<i>Carbonas ammo-</i>
	<i>niae.</i>

Nomina mutata.

Nomina nova.

<i>Sal Glauberi.</i>	Sulphas sodae.
— <i>marinus Hispanus.</i>	Murias sodae.
<i>Sal polychrestus.</i>	Sulphas potassae cum sulphure.
— <i>Rupellensis.</i>	Tartris potassae et sodae.
— <i>succini.</i>	Acidum succinicum
— <i>tartari.</i>	Carbonas potassae purissimus.
<i>Sanguis draconis.</i>	Resina pterocarpi draconis.
<i>Sanalum rubrum.</i>	Pterocarpus santalinus.
<i>Santonicum.</i>	Artemisia santonicum.
<i>Sarsaparilla.</i>	Smilax sarsaparilla.
<i>Sassafras.</i>	Laurus sassafras.
<i>Scammonium.</i>	Gummi-resina convolvuli scammoniae.
<i>Seneka.</i>	Polygala senega.
<i>Senna.</i>	Cassia senna.
<i>Serpentaria Virginiana.</i>	Aristolochia serpentaria.
<i>Simaruba.</i>	Quassia simaruba.
<i>Sinapi album.</i>	Sinapis alba.

<i>Nomina mutata.</i>	<i>Nomina nova.</i>
<i>Soda,</i>	Carbonas sodae.
— <i>muriata.</i>	Murias sodae.
— <i>phosphorata.</i>	Phosphas sodae.
— <i>tartarisata.</i>	Tartris potassae et sodae.
— <i>vitriolata.</i>	Sulphas sodae.
<i>Spiritus aeteris vi-</i> <i>triolici.</i>	Æther sulphuricūs cum alcohole.
— <i>ammoniae.</i>	Alcohol ammonia- tum.
— <i>cornu cervi.</i>	Aqua carbonatis ammoniae.
— <i>Minderceri.</i>	— acetitis ammo- niae.
— <i>salis ammo-</i> <i>niasi.</i>	— carbonatis am- moniae.
— <i>vinosus rectifi-</i> <i>catus.</i>	Alcohol.
<i>Spiritus vinosus</i> <i>tenuior.</i>	Alcohol dilutum.
— <i>camphoratus.</i>	Tinctura campho- rac.
<i>Staphisagria.</i>	Delphinium staphi- sagria.
<i>Stramonium.</i>	Datura stramonium. k

Sulphur antimoniī praecepitatum.
— *auratum antimonii.*

Syrupus balsamicus Toluianus.
— *papaveris albi.*

Sulphuretum antimoniī praecepitatum.

Syrupus toluiferae balsami.
— *papaveris somniferi.*

Taraxacum.

Leontodon taraxacum.

Tartarus ciudus.

Super-tartris potassae impurus.

Tartari crystalli.

— *potassae.*

Tartarus emeticus.

Tartris autimonii.

Tartarum solubile.

— *potassae.*

— *vitriolatum.*

Sulphas potassae.

Terebinthina Veneta.

Resina liquida pinilaricis.

Terra Japonica.

Extractum mimosa catechu.

— *ponderosa vuliartia.*

Sulphas barytae.

Tinctura aloes vitiolata.

Tinctura aloes aetherea.

— *aromatica.*

— *cinnamomi composita.*

— <i>ferri.</i>	→ muriatis ferri.
— <i>cantaridum.</i>	— meloës vesicato- rii.
<i>Tinctura Japoni- ca.</i>	Tinctura mimosae catechu.
— <i>rhei amara.</i>	— rhei et gentia- nae.
— <i>sacra.</i>	Vinum aloes Soco- torinae.
— <i>Tolutana.</i>	Tinctura toluifetae. balsami.
<i>Toxicodendron.</i>	Rhus toxicoden- dron.
<i>Tragacantha.</i>	Astragalus traga- cantha.
<i>Trifolium palu- stre.</i>	Menyanthes trifoliata.
<i>Trochisci Arabici.</i>	Trochisci gummosi.
<i>Turpeithum mine- rale.</i>	Sub-sulphas hydrar- gyri flavus.
<i>Tutia.</i>	Oxidum zinci im- purum.
<i>Unguentum album vel cerusae.</i>	Unguentum oxidi plumbi albi.
— <i>aeruginis.</i>	— sub-acetitis cu- pris.
— <i>caeruleum.</i>	— hydrargyri.

Nomina mutata.

Nomina nova.

<i>Unguentum citrinum.</i>	— nitratis hydrargyri.
— <i>epispasticum fortius.</i>	— pulveris meloes vesicatorij.
— <i>mitius.</i>	— infusi meloes vesicatorii.
— <i>saturninum.</i>	— acetis plumbi.
— <i>tutiae.</i>	— oxidi zinci impuri.
<i>Uva passa.</i>	Fructus siccatus vitis viniferi.
<i>Uva ursi.</i>	Arbatus uva ursi.
<i>Valeriana sylvestris.</i>	Valeriana Officinalis.
<i>Vinum amarum.</i>	Winum gentianae compositum.
— <i>antimoniale.</i>	— tartritis antimoniij.
<i>Vitriolum album.</i>	Sulphas zinci.
— <i>caeruleum.</i>	— cupri.
— <i>viride.</i>	— ferri.
<i>Vitrum antimonii.</i>	Oxidum antimonii cum sulphure vitrificatum.
— <i>ceraatum.</i>	Oxidum antimonii vitrificatum cum cera.

Nomina mutata. Nomina nova.

<i>Witeranus cortex.</i>	<i>Cortex</i>	<i>Winterae</i>
		aromaticae.
<i>Zincum ustum.</i>	<i>Oxidum zinci.</i>	
— <i>vitriolatum.</i>	<i>Sulphas zinci.</i>	
<i>Zingiber.</i>	<i>Amomum zingiber.</i>	

MEDICAMENTORUM NOMINA.

NOVA ET MUTATA.

Nomina nova.

ACETIS hydrargyri.
— potassae.

— plumbi.

Acidum acetosum.
— succinicum.
— sulphuricum.
— aromaticum.

Acorus calamus.

Æsculus hippocastanum.

Æther sulphuricus.
— cum alchohole.

Nomina mutata.

Hydrargyrus acetatus.

Lixiva acetata vel tartarum regeneratum.

Cerussa acetata vel saccharum saturni.

Acetum vini.

Sal succini.

Acidum viiriolicum.

— vitrioli aromaticum.

Calamus aromaticus.

Hippocastanum.

Æther vitriolicus.
Spiritus aetheris vitriolici.

*Nomina nova.**Nomina mutata.*

Alcohol.

*Spiritus vinosus
rectificatus vel
purissimus,
— ammoniae.*Alcohol ammonia-
tum.

— dilutum.

*— vinosus tenuior
vel dilutus.*Ammoniaretum cu-
pri.*Cuprum ammonia-
cam.*

Amomum repens.

*Cardamomum mi-
nus.*

— zingiber.

*Zingiber.*Amygdali commu-
nis nucleus.*Amygdala dulcis.*Amyridis Gileadensis
resina liquida.*Balsamum Gi!ea-
dense.*Anethum fœnicu-
lum.*Foeniculum dulce*Angelica archange-
lica.*Angelica sativa.*

Anthemis nobilis.

Chamaemelum.

— pyrethrum.

*Pyrethrum.*Apium petroseli-
num.*Petroselinum.*Aqua acetitis am-
muniae.*Aqua ammoniae
acetatae, vel spi-
ritus Mindereri.*

*Nomina nova.**Nomina mutata.*

— ammoniae.	<i>Aqua ammoniae causticae.</i>
— carbonatis ammoniae.	<i>— vel spiritus cornu cervi.</i>
— potassae.	<i>— lixivia caustica, vel lixivium causticum.</i>
<i>Arbutus uva ursi.</i>	<i>Uva ursi.</i>
<i>Arctium lappa.</i>	<i>Rardana.</i>
<i>Aristolochia serpentaria.</i>	<i>Serpentaria Virginiana.</i>
<i>Artemisia absinthium.</i>	<i>Absinthium.</i>
— santonicum.	<i>Santonicum.</i>
<i>Astragalus tragacantha.</i>	<i>Tragacantha.</i>
<i>Atropa belladonna.</i>	<i>Belladonna, vel solanum lethale.</i>
<i>Bitumen petroleum</i>	<i>Petroleum barbadense.</i>
<i>Boletus ignarius.</i>	<i>Agaricus.</i>
<i>Boras sodae.</i>	<i>Borax.</i>
<i>Bubonis galbani gummi-resina.</i>	<i>Galbanum.</i>
<i>Calx.</i>	<i>Calx viva.</i>

Nomina nova.

Nomina mixta.

*Capsicum annum.**Piper Indicum.**Carbonas ammoniae.**Ammonia praeparata*, vel *sal cornu cervi.**— barytae.**Barytes.**Carbonas calcis mollior.**Creta alba.**— durior.**Marmor album et lapilli cancrorum.**— ferri.**Ferri rubigo.**— magnesiae.**Magnesia alba.**— plumbi.**Cerussa.**— potassae.**Lixiva purificata*, vel *sal alkalinus fixus vegetabilis purificatus.**— potassae impurus.**— impura vel alkali fixum vegetabile.**— purissimus.**— e tartaro, vel sal tartari.**— sodae impurus.**Barilla.**— sodae.**Soda, vel sal alkalinus fixus fossilis purificatus.*

— zinci impturus.	<i>Lapis calamina-</i> <i>ris.</i>
Carum carui.	<i>Carvi.</i>
Cassia sennæ.	<i>Senna.</i>
Centaurea benedicta.	<i>Carduus benedi-</i> <i>ctus.</i>
Chironia centau- rium.	<i>Centaurium mi-</i> <i>nus.</i>
Cinchonae officina- lis cortex.	<i>Cortex Peruvia-</i> <i>nus.</i>
Citrus aurantium.	<i>Aurantium Hispa-</i> <i>lense.</i>
— medica.	<i>Limon.</i>
Coecus cacti.	<i>Coccinella.</i>
Cochlearia arinota- cia.	<i>Raphanus rustica-</i> <i>nus.</i>
Cocos butyracea.	<i>Palma.</i>
Conium maculaum.	<i>Cicuta.</i>
Convolvuli scam- moniae gummi- resina.	<i>Scammonium.</i>
Convolvulus jalapa.	<i>Jalapa.</i>
Copaiferae officina- lis resina liquida.	<i>Balsamum copai-</i> <i>bae.</i>
Crōton eleutheria.	<i>Cascarilla.</i>
Cucumis colocyn- this.	<i>Colocynthis.</i>

*Nomina nova.**Nomina mutata.*

<i>Daphne mezereum.</i>	<i>Mezereum.</i>
<i>Datura stramonium</i>	<i>Stramonium.</i>
<i>Delphinium staphisagria.</i>	<i>Staphisagria.</i>
<i>Dianthus caryophyllus.</i>	<i>Caryophylla rubra.</i>
<i>Dorstenia contrajerva.</i>	<i>Contrajerva.</i>
<i>Emplastrum meloes vesicatorii.</i>	<i>Emplastrum vesicatorium.</i>
— <i>oxidi ferri rubri.</i>	— <i>roborans.</i>
— <i>plumbi semi-vitrei.</i>	— <i>commune vel lithargyri.</i>
<i>Emulsio amygdalae communis.</i>	<i>Emulsio communis.</i>
<i>Ferulae assae foetidae gummi-resina.</i>	<i>Assa foetida.</i>
<i>Fraxini orni succus concretus.</i>	<i>Manna.</i>
<i>Gummi mimosae Niloticae.</i>	<i>Gummi Arabicum</i>

*Nomina nova.**Nomina mutata.*

Haematoxylī Cam-
pechiani lignum.

Lignum Campe-
chense.

Helleborus niger.

Melampodium:

Hydrgyrus.

Argentum vivum,
sive mercurius.

Juniperi Lyciae resi-
na.

Olibanum..

Juniperus sabina.

Sabia.

Laurus cassia.

Cassia lignea.

Laurus cinnamo-
mum.

Cinnamomum.

— sassafras.

Sassafras.

Leontodon taraxa-
cum.

Dens leonis.

Magnesia.

Magnesia usta.

Mela leucadendron.

Cajeputa.

Meloe vesicatorius.

Cantharis.

Mentha pulegium.

Fulegium.

Menyanthes trifoliata.

Trifolium.

Mimosae catechu
extractum.

Terra Japonica.

Momordica elate-
rium.

Cucumis agrestis.

Momordicae elate-
rii succus spissa-
tus.

Elaterium.

Murias ammoniae.

*Ammonia muria-
ta;*, vel *sal am-
moniacus.*

— et ferri.

*Ferrum ammonia-
tum*, vel *flores
martieles.*

— antimonii.

*Antimonium mu-
riatum*, vel *bu-
tirum antimonji.*

— hydrargyri.

*Mercurius subli-
matus eorrosi-
vus.*

— sodae.

Soda muriatu, *sal-
marinus*, vel
muria.

Myroxylī Peruifērī
balsamum.

*Balsamum Peru-
vianum..*

Myrtus pimenta.

Pimenta.

Nitras argenti.

*Argentum nitra-
tum* vel *causti-
cum lunare.*

— potassae.

Nitrum.

Olea fixa.

— *volatilia.*

Origanum majorana

Oxidum antimonii
cum sulphurae
per nitratum po-
tassae.

— *antimonii cum*
phosphati calcis.

— *antimonii cum*
*sulphure vitrifi-
catum.*

— *antimonii vitri-
ficatum cuin cera.*

— *arsenici.*

— *ferri nigrum.*

— *rubrum.*

— *hydrargyri ci-
nereum.*

— *hydrargyri su-
brum per acidum
nitricum.*

Olea expressa.

— *stillatitia vel*
essentialia.

Majorana.

Crocus antimonii,
vel *crocus me-
tallorum.*

*Pulvis antimonia-
lis, vel antimo-
nium calcareo-
phosphoratum.*

Vitrum antimonii.

*Vitrum antimonii-
ceratum.*

Arsenicum.

Ferri squamae.

*Ferrum vitriola-
tum ustum vel
colcothar vitrioli*

*Hydrargyrus præ-
cipitatus cine-
reus.*

— *nitratus ruber,*
vel *praecipitatus
ruber.*

*Nomina nova.**Nomina mutata.*

— plumbi album.

Cerusa.

— rubrum.

*Minium, vel plum-
bum istum rubrum.*

— semivitreum.

*Lithargirus, vel
plumbum ustum.*

— zinci.

*Zincum ustum,
vel flores zinci,*

— impurum.

*Tutia.**Pilulae opiatæ.**Pilulae opii, vel
thebaicae.**Pimpinella anisum.**Anisum.**Pini abietis resina
sponte concreta.**Pix Burgundica.*— balsameæ resina
liquida.*Balsamum Cana-
dense.**Pini laricis resina
liquida.**Terebinthina Ve-
neta.*

— oleum volatile.

*Oleum terebinthi-
nae.*— sylvestris resina
empireumatica.*Pix liquida.**Pistaciae lentisci re-
sina.**Mastiche.**Phosphas sodae.**Soda phosphorata,**Polygala senega.**Seneka:**Polygonum bistor-
ta.**Bistorta.*

Nomina nova. *Nomina mutata.*

<i>Polypodium.</i>	<i>silix.</i>	<i>Filix mas.</i>
	<i>mas.</i>	
<i>Potassa.</i>		<i>Causticum commune acerrimum.</i>
— <i>cum calce.</i>		— <i>mitius.</i>
<i>Potio carbonatis calcis.</i>		<i>Potio cretacea.</i>
<i>Pterocarpi draconis resina.</i>		<i>Sanguis dragonis.</i>
<i>Pterocarpus santalinus.</i>		<i>Santalum rubrum.</i>
<i>Pulvis carbonatis calcis compositus.</i>		<i>Pulvis cretaceus.</i>
— <i>ipecacuanhae et opii.</i>		— <i>ipecacuanhae compositus.</i> vel <i>Doveri.</i>
— <i>sulphatis aluminae compositus</i>		— <i>aluminis compositus</i> , vel <i>stypticus.</i>
<i>Quassia simaruba.</i>		<i>Simarouba.</i>
<i>Resina pini.</i>		<i>Resina alba.</i>
<i>Rheum palmatum.</i>		<i>Rhabarbarum.</i>
<i>Rhus toxicodendron.</i>		<i>Toxicodendron.</i>
<i>Rosa canina.</i>		<i>Cynosbatos.</i>
— <i>centifolia.</i>		<i>Rosa pallida.</i>

*Nomina nova.**Nomina mutata.*— *Gallica.*

Sisymbrium nastur-tium.

Smilax sarsaparilla.

Solutio sulphatis cupri composita.

Spartium scoparium

Styracis benzoin bal-samum.

Sub-acetis cupri.

Sub-murias hydrar-gyri.

--- *hydrargyri prae-cipitatus.*

Sub-sulphas hydrar-gyri flavus.

Sulphas aluminae.

--- *exiccatus.*

--- *cupri.*

— *Rubra.*

Nasturtium.

aquaticum.

Sarsaparilla.

Aqua cupri vitrio-lati composita ;
vel *styptica.*

Genista.

Benzoinum.

Ærugo.

Hydrargyrus mu-riatus mitie vel calomelas.

Hydrargyrus mu-riatus praecipi-tatus.

Hydrargyrus vi-triolatus flavus,
vel *turpethum*
minerale.

Alumen.

— *ustum.*

Cuprum vitriola-tum, vel *vitriolum coeruleum.*

*Nomina nova.**Nomina mutata.*

--- ferri.	<i>Ferrum vitriolatum</i> , vel <i>vitriolum</i> , <i>viride</i> .
--- magnesiae.	<i>Magnesia vitriolata</i> , vel <i>sal calcarticus amarus</i> .
--- potassae.	<i>Lixiva vitriolata</i> , vel <i>tartarum vitriolatum</i> .
--- cum sulphure.	<i>Lixivia vitriolata sulphurea</i> , vel <i>sal polychrestus</i> .
-- sodae.	<i>Soda vitriolata</i> , vel <i>sal Glauberi</i> .
— zinci.	<i>Zincum vitriolateum</i> , vel <i>vitriolum album</i> .
Sulphur sublimatum.	<i>Flores sulphuris</i> .
Sulphuretum antimoniī.	<i>Antimonium</i> .
--- antimoniī praecipitatum.	<i>Sulphur antimoniī praecipitatum</i> , vel <i>auratum</i> .
Sulpuretum hydrargyri rubrum.	<i>Cinnabaris factitia</i> .

*Nomina nova.**Nomina mutata.*

— hydrargyri ni-	<i>Hydrargyrus sul-</i>
grum.	<i>phuratus niger,</i> vel <i>aethiops mi-</i>
	<i>neralis.</i>
— potassae.	<i>Hepar sulphuris.</i>
Super-tartris potas-	<i>Tartarus crudus.</i>
sae impurus.	
— potassae.	<i>Tartarus purifica-</i>
	<i>tus, vel crystal-</i>
	<i>li tartari.</i>
Syrpus Toluiferae	<i>Syrpus balsami-</i>
balsami.	<i>cus.</i>
Tartris antimonii.	<i>Antimonium tarta-</i>
	<i>risatum, vel tar-</i>
	<i>tarus emeticus.</i>
— potassae.	<i>Lixiva tartarisata</i>
	<i>vel tartarum so-</i>
	<i>lubile.</i>
— et sodae.	<i>Soda tartarisata,</i>
	<i>vel sal Rupel-</i>
	<i>lensis.</i>
Tinctura benzoin	<i>Balsamum trau-</i>
composita,	<i>maticum,</i>
— camphorae.	<i>Spiritus vinosus</i>
	<i>camphoratus.</i>
— sennae compo-	<i>Elixir saluis.</i>
sita.	

*Nomina nova.**Nomina mutata.*

— muriatis ferri.	<i>Tinctura ferri</i> , vel <i>martis.</i>
— rhei et gentianac.	— <i>rhei amara.</i>
— opii.	<i>Laudanum liquidum</i> , vel <i>tinctura thebaica.</i>
— saponis.	<i>Linimentum saponaceum.</i>
— et opii. Toluifera balsamum.	— <i>anodynum.</i> <i>Balsamum Tolutaniim.</i>
Unguentum nitratit hydroargyri fortius.	<i>Unguentum citrinum.</i>
Veratrum album.	<i>Helleborus albus.</i>
Vinum aloes sototorinae.	<i>Vinum aloeticum,</i> vel <i>tinetura sacra.</i>
— tartritis antimoniis.	— <i>antimonii tartratisati</i> , vel <i>vinum antimoniale.</i>

F I N I S.

VA 1 152066 93

95.C.17

150 - 163

Mancanti dalla pagina 151
fino alla pagina 162 verificate
ad di 14 Febbrajo 1828. —
A. Monfreid

BIBL
VR

L